Handlungsstandards für den Rettungsdienst Wittmund

**RETTUNGSDIENST
WITTMUND**
gGmbH

Wittmunder Kompass 2024 / 2025

Herausgeber: Dr. med. Oliver Rickes
Mitarbeiter Ärztliche Leitung Rettungsdienst

Landkreis Wittmund
Am Markt 9
26409 Wittmund

Autor: Dr. med. Oliver Rickes

Unter Mitwirkung von: Keno Tellinghusen und Rainer Vogt

Layout und Design: Dr. med. Oliver Rickes

Coverfotos: Herzigs Einsatzfahrten

Kapitelfoto Medikamente: Rainer Vogt

Medikamentenfotos: Aus Bechtold H, Rickes O (2021) Pharmakologie
für den Rettungsdienst. 1. Aufl., Elsevier, München

Idee der Namensgebung „Wittmunder Kompass“: Rainer Vogt

Redaktion: Dr. med. Renate Hennig

1. Auflage

Der WITTMUNDER KOMPASS steht in digitaler Form als Download auf der Internetseite der Rettungsdienst Wittmund gGmbH und über den QR-Code zur Verfügung. <https://www.rd-wittmund-ggmbh.de>

Die Verbreitung und Vervielfältigung ist zu nicht-kommerziellen Zwecken erlaubt.

Anregungen & Kritik bitte an: oliver.rickes@rd-wittmund-ggmbh.de

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter (m/w/d).

Inhaltsverzeichnis**Einleitung**

› Vorwort	04
› Nutzungs- und Haftungshinweise	08
› Erstmaßnahmen	11
› Algorithmus - Erstmaßnahmen, nicht-traumatologisch	12
› Algorithmus - Erstmaßnahmen, traumatologisch	13

c kleines C / CPR

› Kritische Blutung	14
› Kardiopulmonale Reanimation Kinder	16
› Kardiopulmonale Reanimation Erwachsener	18

A Airway - Atemweg

› Krupp-Syndrom	19
› Epiglottitis	20
› Dyspnoezeichen beim Kind	21
› Atemwegsmanagement	22

B Breathing - Atmung

› Kardiales Lungenödem	23
› Akuter Asthmaanfall / Exacerbierte COPD	24
› NIV (bei hypoxämischer ARI)	24
› NIV (bei hyperkapnischer ARI)	25

C Circulation - Kreislauf

› Akutes Coronarsyndrom	28
› Lebensbedrohliche Tachykardie	38
› Instabile Bradykardie	39
› Hypertensiver Notfall	41
› Anaphylaktische Reaktion	42

D Disability - Neurologie

› Schlaganfall	44
› Opioidintoxikation	46
› Generalisierter Anfall Erwachsener (bestehend)	47
› Generalisierter Anfall Kind (bestehend)	48
› Hypoglykämie	50

E Environment - Umfeld

› Z.n. Fieberkrampf	51
› Starke Schmerzen (ab 12 Jahren)	52
› Abdominelle Schmerzen	53
› Sepsis	54
› Orale Intoxikation	55
› Thermische Verletzung	56
› Erstversorgung Neugeborenes	58
› Analgo-Sedierung mit Esketamin	59
› Akuter Harnverhalt	62

Medikamente

› Acetylsalicylsäure	64
› Adrenalin/Epinephrin	65
› Amiodaron	66
› Atropin	67
› Butylscopolamin	68
› Cimetidin	69
› Clemastin	70
› Dimenhydrinat	71
› Esketamin	72
› Furosemid	73
› Glukose 20 %	74
› Glyceroltrinitrat	75
› Heparin	76
› Ipramol	77
› Kohle	78
› Metamizol	79
› Midazolam	80
› Morphin	82
› Naloxon	83
› Ondansetron	84
› Paracetamol	85
› Piritramid	86
› Prednisolon	87
› Prednison	88
› Reproterol	89
› Tranexamsäure	90
› Urapidil	91
› Perfusor-Einstellungen	92
› Narkosemedikamente	94

Leitstelle

› Umgang mit der Leitstelle	96
-----------------------------	----

Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich sehr, Euch die 1. Auflage des „Wittmunder Kompass“ vorstellen zu dürfen. Wie angekündigt, habe ich die vergangenen drei Jahre genutzt, das Format unserer „SOPs“ auszubauen und weiterzuentwickeln. Vielen Dank für die zahlreichen konstruktiven Rückmeldungen, das Feedback in den Schulungen und den persönlichen Gesprächen zu Verbesserungsvorschlägen und Ideen zur weiteren Umsetzung der Konzeption. Unsere Algorithmen sind sowohl inhaltlich als auch optisch in ihrer Struktur überarbeitet worden, sodass die praktische Anwendung im Einsatz noch einfacher und klarer erfolgen kann. Zukünftig sollen die Algorithmen, nach dem Motto „Keep it simple“, so einfach wie möglich gehalten werden. Zudem haben nicht nur unsere Rettungswagen im Zuge der Rekommunalisierung einen neuen „Farbanstrich“ erhalten, sondern auch das Büchlein erstrahlt in einem neuen Design mit eigenem Namen.

Ich hoffe, Euch mit diesen inhaltlichen, strukturellen und visuellen Veränderungen noch mehr Sicherheit für den Einsatz an die Hand geben zu können und wünsche Euch, dass der „Wittmunder Kompass“ Euch immer den rechten (Behandlungs-) Weg aufzeigt.

Neben den bekannten Algorithmen stehen mit dem Algorithmus „Krupp-Syndrom“ und „Epiglottitis“ nun auch zwei weitere Algorithmen zur Behandlung der kindlichen Atemnot zur Verfügung. Ich bin froh darüber, dass endlich auch ein neuer Reanimations-Algorithmus für Erwachsene – gemäß den Vorgaben des German Resuscitation Council (GRC) – Einzug in unser Büchlein erhalten hat und vor allem, dass dieser in unseren ALS-Trainings auch praktisch umgesetzt und trainiert wird. Ebenfalls findet sich der Reanimations-Algorithmus für Kinder, sowie der Versorgungspfad für Neugeborene in den entsprechenden Kapiteln wieder. Gerne möchte ich Euch auch zu speziellen Themen Erklärungen, Dossier- und Merkhilfen über dieses Medium an die Hand geben, damit Ihr im Einsatz bestens vorbereitet seid beziehungsweise das ein oder andere auch nach dem Einsatz noch einmal nachlesen könnt. Ich möchte den „Wittmunder Kompass“ zukünftig zu einem umfassenden Vademecum weiterentwickeln, welches nicht nur weitere Algorithmen, sondern auch viele Hintergrund- und Zusatzinformationen enthält.

Alle Algorithmen sind an aktuelle Leitlinien und Empfehlungen angepasst worden. Des Weiteren habe ich die Notarznachforderung bei vielen Zustandsbildern in das eigene Ermessen gelegt, sodass selbständig je nach Zustand des Patienten

entschieden werden kann, ob ein Notarzt erforderlich ist oder nicht. Eine Ausnahme stellt hier immer noch das akute Coronarsyndrom dar. Der akute Thoraxschmerz ist weiterhin eine häufige Einsatzindikation. Auch wenn viele Patienten sich als „stabil“ und ohne „Hebungen“ im EKG erweisen, kann gerade in diesen Fällen ein Herzinfarkt gerne übersehen werden und die Bahnung in die richtige Zielklinik mit entsprechender Therapie verzögert werden. Bei diesen Patienten sind nicht nur eine differenzierte Anamnese sowie eine fokussierte Untersuchung von großer Bedeutung, sondern auch die sichere Befundung des 12-Kanal-EKG mit zum Beispiel auch der Kenntnis über die „STEMI-Äquivalente“. Somit wurde auch dieser Algorithmus überarbeitet und an die neue Nomenklatur „NOMI“ und „OMI“ angepasst. Auch zu diesem Themenkomplex habe ich Euch einiges an wertvollen Informationen zum Nachlesen zusammengestellt.

Der Versorgungspfad zur NIV-Therapie wurde in zwei separate Algorithmen aufgeteilt, um den Unterschied zwischen der hypoxischen und hyperkapnischen akuten respiratorischen Insuffizienz (ARI) besser darzustellen.

Die Evaluation der Piritramidgabe über die letzten Jahre hat mir gezeigt, dass in den allermeisten Fällen sehr verantwortungsbewusst mit dem Betäubungsmittel umgegangen wurde, sodass ich mich zu einer Erweiterung der Freigabe entschieden habe. Piritramid darf nun ab 12 Jahren bei allen Schmerzzuständen ab einer Schmerzstärke von 5 verabreicht werden. Ausnahmen stellen Indikationen dar, welche in anderen Algorithmen wiederzufinden sind, wie zum Beispiel die Morphingabe beim akuten Coronarsyndrom oder die Piritramidgabe als Eskalationsstufe bei abdominalen Schmerzen.

Zertifizierte Anwender können bei entsprechender Indikation auf die Gabe von Esketamin ausweichen. Sollte es im Rahmen einer Analgesiebehandlung zu Fragen, Problemen oder dem Abweichen vom Versorgungspfad kommen, ist es in diesen Fällen erforderlich primär auf das „Call-back-System“ zurückzugreifen.

Das kardiale Lungenödem soll im Einklang mit aktuellen Leitlinien primär mit Nitraten und CPAP therapiert werden. Oft handelt es sich nicht um eine Überwässerung, sondern um eine Fehlverteilung des Blutvolumens. Furosemid aktiviert das RAAS (Renin-Angiotensin-Aldosteron-System) und führt damit zu einer Steigerung der Vorlast und ist somit kontraproduktiv. Aus diesem Grund wird Furosemid nur noch bei einer Hypervolämie verabreicht.

Die „Kritische Blutung“ wurde an die Inhalte der neuen S3-Polytraumaleitlinie angepasst, die ein eskalierendes Stufenschema der Blutungskontrolle vorsieht, mit einem früheren Einsatz der Celox® Gaze und erst als letzte Option den Einsatz des Tourniquets. Die Gabe von Tranexamsäure erfolgt nur dann, wenn die Blutung nicht zu kontrollieren ist.

Bei Kontraindikationen gegen Atropin oder einer Atropin-resistenten Bradykardie kann nun vor der Pacer-Therapie versucht werden mit Adrenalin die Herzfrequenz zu steigern. Auch hierzu wird die Verfahrensweise genauestens erklärt.

Beim Versorgungspfad „Anaphylaktische Reaktion“ finden nun auch die Kinder sowohl bei der Prednisolongabe, als auch bei der Gabe eines Antihistaminikums Berücksichtigung. Aus diesem Grund wird unser H1-Blocker Dimetinden (Fenistil®) auf Clemastin (Tavegil®) umgestellt, da dieser auch für Kinder zugelassen ist.

Die Glucosegabe beim Schlaganfall wurde von 4 g auf 8 g erhöht und somit an die Dosis im Algorithmus „Hypoglykämie“ angepasst.

Der Themenkomplex des generalisierten Anfalls wurde entzerrt und in drei verschiedene Versorgungspfade aufgeteilt. Beim bestehenden generalisierten Anfall wird zwischen Erwachsenen und Kindern unterschieden. Auch hierbei wurde bei den Erwachsenen der Einfachheit halber, bewusst auf gewichtsadaptierte Dosierungen verzichtet. Die antipyretische Therapie für Kinder findet sich nun im separaten Algorithmus „Z.n. Fieberkrampf“ wieder.

Der Sepsispfad wurde um eine fiebersenkende Option mit Paracetamol erweitert.

Ich bitte um Nachsicht, dass sich die beiden Versorgungspfade „Analgo-Sedierung“ und „Akuter Harnverhalt“ noch im alten Design befinden. Nichtsdestotrotz sind sie der Vollständigkeit halber in diese Algorithmensammlung mit aufgenommen worden und werden bei der nächsten Überarbeitung an das neue Design angepasst.

Ich bedanke mich im Rahmen dieser allerersten Auflage im neuen Design bei unseren Bremer Kollegen, vor allem bei Dr. Andreas Callies für die nicht selbstverständliche Unterstützung dieses großen Projektes. Ihm habe ich es zu verdanken, dass die Übernahme der Grundstruktur aus der "Bremer-Fibel" für unsere Zwecke genutzt werden durfte. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön dafür! Dies hat mir die Mediengestaltung erheblich erleichtert. Herzlichen Dank auch an Frau Stephanie Simond für Ihre Hilfe bei der graphischen Umsetzung des Covers und für die Prüfung rechtlicher Aspekte bei der Veröffentlichung des Werks. Danke auch an Philipp Graafs und Jörn Grzeskowiak für die Unterstützung bei der Digitalisierung. Ich bedanke mich auch für die gute Zusammenarbeit mit Michael Grönheim und Sven Neumann und freue mich, dass auch die Leistelle in unserem Werk vertreten ist. Dank der guten Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Beyer vom S+K-Verleg können wir nun zum Ende des Jahres eine Druckversion in Form von Taschenbüchern zur Verfügung stellen. Zuletzt ein großes Dankeschön an Rainer Vogt, der mit vollem Enthusiasmus an einem Namen für dieses Werk gefeilt und mit vollem Eifer an der Weiterentwicklung der Algorithmen sowie der Anfertigung neuer Fotos gearbeitet hat.

Außerdem bedanke ich mich, auch im Namen des Rettungsdienstträgers, bei allen Mitarbeitenden des Wittmunder Rettungsdienstes für die gewissenhafte und tolle Arbeit!

Herzliche Grüße,

Oliver Rickes

Wittmund, im Oktober 2024

Nutzungs- und Haftungshinweise

Ziel

Ziel dieser Handlungsstandards ist es, Bedingungen zu schaffen, um in unserem Landkreis eine bestmögliche Patientenversorgung zu erreichen und dem einzelnen nichtärztlichen Rettungsdienstmitarbeitenden rechtssicheres Arbeiten zu ermöglichen. Diese Handlungsstandards gelten für Notfallsanitäter der Rettungsdienst Wittmund ggmbH.

Die im "Wittmunder Kompass" durch die Ärztliche Leitung Rettungsdienst in Form von Algorithmen beschriebenen Medikamentengaben und erweiterten Maßnahmen entsprechen im NotSanG den sog. „2c-Maßnahmen“ (vgl. § 4 Abs. 2 Nr. 2c NotSanG) und stellen dementsprechend eine Dienstanweisung dar.

Mit der Novellierung des Notfallsanitätergesetzes (NotSanG) am 12.02.2021 ist durch den neuen § 2a („Eigenverantwortliche Durchführung heilkundlicher Maßnahmen durch Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter“) eine Konkretisierung der eigenverantwortlich durchzuführenden heilkundlichen Maßnahmen verbunden mit dem Ziel einer höheren Rechtssicherheit für Notfallsanitäter umgesetzt worden. Sollte bis zum Beginn einer ärztlichen Versorgung, eine Maßnahme, die nicht durch einen Algorithmus im Sinne einer 2c-Maßnahme im „Wittmunder Kompass“ geregelt sein sollte, zur Abwendung von Lebensgefahr oder wesentlicher Folgeschäden von Patienten erforderlich sein, dürfen Notfallsanitäter heilkundliche Maßnahmen eigenverantwortlich durchführen, sofern sie diese Maßnahmen in der Ausbildung erlernt haben und beherrschen. Die Verantwortung für diese Maßnahmen liegt ausschließlich bei dem durchführenden Notfallsanitäter.

Im Falle der Anwendung sind die vorgegebenen Algorithmen einzuhalten, um größtmögliche Handlungskompetenz und Sicherheit für den Patienten zu gewährleisten.

Aufbau

Die einzelnen Algorithmen sind nach dem cABCDE-Schema im Inhaltsverzeichnis farblich markiert und entsprechend einsortiert. Hellgraue Kästen stellen Basis- und Standardmaßnahmen dar, weiße Rauten sind Entscheidungspunkte. Gelbe Kästen stellen Medikamentengaben bzw. erweiterte Maßnahmen entsprechend der sog. „2c-Maßnahmen“ dar, welche in der Schulung gelehrt und mit anschließender Kompetenzüberprüfung zertifiziert werden.

Die beiden roten Kästen „Intubation“ und „Koniotomie“ sind Maßnahmen, die alleinig zur Lebensrettung oder zur Abwendung wesentlicher Folgeschäden durchgeführt werden dürfen und setzen zwingend das höchste Kompetenzniveau („beherrschen“) voraus. Es kann, vor allem auch zum Schutz des Notfallsanitäters, nicht regelhaft davon ausgegangen werden, dass ein Notfallsanitäter eine endotracheale Intubation oder eine Koniotomie beherrscht. Daher sind diese Maßnahmen im Wittmunder Kompass „rot“ dargestellt. D.h. diese Maßnahmen sind somit nur nach individueller Kompetenzeinschätzung durch den Notfallsanitäter zu erwägen und in eigener Verantwortung durchzuführen

Fortbildung

Die sichere Umsetzung der Handlungsstandards setzt ein kontinuierliches Selbststudium aller im Wittmunder Rettungsdienst tätigen Mitarbeitenden voraus. Hierfür werden seit 2019 vielfältige Lehrinhalte über die online-Lern-Plattform GoToWebinar zur Verfügung gestellt. Ergänzt durch regelmäßige Rettungsdienstfortbildungen sollen theoretische und praktische Kenntnisse vertieft werden. Ziel der regelmäßigen Fort- und Weiterbildung sowie Kompetenzüberprüfung des nichtärztlichen Rettungsdienstfachpersonals ist es, die Qualität der nichtärztlichen Versorgung von Notfallpatienten stets zu steigern.

Dokumentation und Erweiterte Versorgungsmaßnahmen (EVM)

Sämtliche durchgeführte Maßnahmen sind auf dem Einsatzprotokoll zu dokumentieren. Dabei sind insbesondere die durchgeführten (Basis-)Maßnahmen bis zum Eintreffen des Notarztes festzuhalten. Alle „Erweiterten Versorgungsmaßnahmen“ (EVM) - also gelbe Kästen - sind im NIDA-Pad unter EVM separat zu dokumentieren. Die Verabreichung von Piritramid, Morphin oder Esketamin sind zusätzlich im separaten Evaluationsbogen zu dokumentieren.

Dosierungshinweis

Die Dosierungsempfehlungen für eine intravenöse (i.v.), sublinguale (s.l.) und perorale (p.o.) Medikamentengabe gelten, sofern nicht abweichend für Kinder beschrieben, für Erwachsene.

Erstmaßnahmen

Einsatzstelle / Situation / Sicherheit

- › Persönliche Schutzausrüstung
- › Gefahren an der Einsatzstelle
- › Eigengefährdung
- › Anzahl Betroffener/Verletzter

- › Rückmeldung
- › Nachforderung

Ersteinschätzung

- › Gesamteindruck / Bewusstseinslage / Reanimationspflicht
- › Radialispuls / Rekapillarierungszeit
- › Schnelle Inspektion von Kopf und Rumpf
- › Hautfarbe und Temperatur
- › Kurzanamnese

- › Notarzt alarmieren

**Algorithmus -
Erstmaßnahmen,
nichttraumatologisch**

**Algorithmus -
Erstmaßnahmen,
traumatologisch**

Algorithmus - Erstmaßnahmen, nichttraumatologisch

Critical Bleeding/CPR

- › Unmittelbar lebensbedrohliche Verletzungen
- › Reanimationspflicht

- › Kritische Blutungen komprimieren, Tourniquet
- › Kardiopulmonale Reanimation

A Airway - Atemweg

- › Atemwege frei?
- › Inspektion des Mund-Rachen-Raumes

- › Freimachen der Atemwege
- › Absaugen
- › Atemwegsmanagement
- › Inhalation
- › Krupp-Syndrom
- › Epiglottitis
- › Anaphylaxie

B Breathing - Atmung

- › Ausreichende Atmung und Oxygenierung?
- › Inspektion
- › Palpation
- › Auskultation, Atemgeräusche
- › Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung

- › Sauerstoffgabe
- › Beatmung
- › NIV bei hyperkapnischer ARI (z.B. COPD)
- › NIV bei hypoxämischer ARI (z.B. kardiales Lungenödem)
- › Anaphylaxie

C Circulation - Kreislauf

- › Kontrolle der peripheren, ggf. zentralen Pulse
- › Rekapillarisierungszeit
- › RR-Messung (mindestens alle 5 Minuten)
- › EKG (zur Überwachung)
- › 12-Kanal-EKG (u.a. bei Thoraxschmerzen, Dyspnoe)

- › Venenpunktion
- › Akutes Koronarsyndrom
- › Hypertensiver Notfall
- › Instabile Bradykardie
- › Lebensbedrohliche Tachykardie
- › Anaphylaxie

D Disability - Neurologie

- › Beurteilung der Bewusstseinslage
- › GCS, Sensibilität, Motorik, Sprache
- › Inspektion, Pupillenreaktion
- › Blutzuckerkontrolle

- › Schlaganfall
- › Bestehender Krampfanfall
- › Hypoglykämie

E Environment - Umgebung/Umfeld

- › Inspektion
- › Temperaturmessung, Wärmeerhalt
- › Anamnese
- › Dokumentation

- › Zustand nach Fieberkrampf
- › Geburtsbegleitung
- › Übelkeit/Erbrechen
- › Anamnese
- › Analgesie bei kolikartigen, abdominalen Schmerzen

Algorithmus - Erstmaßnahmen, traumatologisch

- ✓ bedrohliche Blutung
- ✓ Patient (pot.) kritisch?
 - Gesamteindruck
 - Recap / Puls / Hautfarbe

➤ **Tourniquet vor Ort < 15 Min.**

- **HWS fixieren**
- ✓ Prüfung Atemwege
- ✓ Inspektion Mundraum

➤ **HWS Immobilisation**
 ➤ **Atemwege freimachen**
 ➤ **Airwaymanagement**

- ✓ SpO₂
- ✓ AF
- ✓ Inspektion,
- ✓ Auskultation,
- ✓ Palpation Thorax

➤ **O2-Gabe über Maske**
 ➤ **Beatmung bei Ateminsuffizienz**
 ➤ **Intubation z.B. bei instabilem Thorax**
 ➤ **Thoraxdrainage bei Spannungspneu**

- ✓ Recap / Puls / Hautfarbe
- ✓ Halsvenenstauung?
- ✓ Abdomen / Becken / OS

➤ **1 großer i.v.-Zugang**
 ➤ **Infusion restriktiv**
 ➤ **RR: 80mmHg sys ausreichend**
 ➤ **Trochantergurt + Innenrotation**

- ✓ GCS
- ✓ Pupillen
- ✓ Kopfuntersuchung
- ✓ senso-mot. Defizit

➤ **A-B-C sicherstellen**
 ➤ **SHT → Narkose**
 ➤ **SHT → RRsys 120mmHg**
 ➤ **Vollimmobilisation**

- ✓ Entkleiden
- ✓ secondary survey
- ✓ AMPEL

➤ **Wärmeerhalt**
 ➤ **Analgo-Sedierung**
 ➤ **Reposition / Fixierung**

Nachforderung Notarzt
NotSan: Eigenes Ermessen

Kleines c

Kritische Blutung

Körperstamm

Extremität

- › Tamponade mit **Celox® Gaze**
- › **Druckverband**
- › ggf. **manuelle Kompression**
- › offene Thoraxverletzung: Chest-Seal®

Blutung kontrolliert?

nein

- › **2. Druckverband**
- › manuelle Kompression

Blutung kontrolliert?

nein

„Load and go“
1 g Tranexamsäure
während des Transportes

Weiteres Vorgehen nach
ABCDE
Transport

Fraktur/OSG-Luxation?

nein

- › **achsengerechte Reposition**
- › Immobilisation Vakuumschiene

- › Extremität **hochlagern**
- › ggf. **Celox® Gaze**
- › **Druckverband**
- › ggf. **manuelle Kompression**

Blutung kontrolliert?

nein

- › **2. Druckverband**
- › manuelle Kompression

Blutung kontrolliert?

nein

Anlage Tourniquet

Blutung kontrolliert?

nein

Hypothermie-Prophylaxe

Bei Zeichen für Beckentrauma:
Trochantergurt anlegen!

Tourniquet als taktisches Hilfsmittel (z.B. bei MANV); Analgesie bedenken!

„Kleines C“-Set

Kleines c

Kleines C ①

- 1 x Tourniquet
- 1 x OLAES®-Bandage
- 1 x Celox®-Gaze

CPR

Keine normale Atmung / kein Lebenszeichen

**Kardiopulmonale Reanimation
Neugeborene* bis Pubertät**

Notarzt alarmieren

Gemäß ERC

**5 Beatmungen
mit 100% O₂**

**CPR 15:2
Bis Kinder-Pads angeschlossen**

Rhythmuskontrolle

Kammerflimmern/
pulslose VT

**Defibrillation
4 J / kg**

CPR sofort für 2 Min.
weiterführen

Nach der 3. Defibrillation:
0,01 mg / kg Adrenalin i.v.
(1 mg + 9 ml NaCl,
0,1 ml / kg)
Alle 3-5 Min.

5 mg / kg Amiodaron i.v.
(pur aufziehen,
0,1 ml / kg)
einmalig

Nach der 5. Defibrillation:
5 mg / kg Amiodaron i.v.
(pur aufziehen, 0,1 ml / kg)
einmalig

ROSC

Sofortige Behandlung

- cABCDE-Schema anwenden
- Hypoxie häufigste Ursache
- Monitoring vervollständigen
- Pulsoxy, Kapno und RR
- Ziel SpO₂: 94-98%
- Normokapnie: 35-45 mmHg
- Vermeiden von Fieber
- Ziel T: 32-36°C

Asystolie/
PEA

CPR sofort für 2 Min.
weiterführen

Sobald i.v.-Zugang liegt:
0,01 mg / kg Adrenalin i.v.
(1 mg + 9 ml NaCl,
0,1 ml / kg)
Alle 3-5 Min.

Besonderheiten:

- *Neugeborene:nicht unmittelbar nach Geburt (Vgl. siehe Versorgungspfad Neugeborener)
- Kind nicht schütteln!
- Keine Pulskontrolle
- Beatmung möglichst 2-händig
- Kopf in Neutralposition, an Nackenrolle oder Schulterpolster denken
- LM ist empfohlene Atemwegssicherung
- Hypoxie ist häufigste reversible Ursache im Kindesalter

Medikamentendosierung Kinderreanimation

CPR

- Adrenalin 1 auf 10 aufziehen, wie beim Erwachsenen
- **0,1 ml / kg verabreichen**
- 10 kg -> 1,0 ml
- 15 kg -> 1,5 ml
- 20 kg -> 2,0 ml
- Bei Neugeborenen unter 10 kg, kann die Menge über einen Dreiweghahn in eine Totraumspritze abgezogen und darüber verabreicht werden.

- Amiodaron pur 150mg / 3 ml aufziehen, wie beim Erwachsenen
- **0,1 ml / kg verabreichen**
- 10 kg -> 1,0 ml (50 mg)
- 15 kg -> 1,5 ml (75 mg)
- 20 kg -> 2,0 ml (100 mg)
- Aufgrund der ölig, schaumigen Eigenschaften, sollte das Medikament immer über einen Dreiweghahn in eine Totraumspritze abgezogen und darüber verabreicht werden.

Keine normale Atmung / kein Lebenszeichen

Kardiopulmonale Reanimation

CPR

Notarzt alarmieren

CPR 30:2
bis Defi angeschlossen

Rhythmuskontrolle

Kammerflimmern/
pulslose VT

Defibrillation
200 J

CPR sofort für 2 Min.
weiterführen

Nach der 3. Defibrillation:
1 mg Adrenalin i.v.
(1 mg + 9 ml NaCl)
Alle 3-5 Min.

300mg Amiodaron i.v.
(pur aufziehen)
einmalig

Nach der 5. Defibrillation:
150 mg Amiodaron i.v.
(pur)
einmalig

Asystolie/
PEA

CPR sofort für 2 Min.
weiterführen

Sobald i.v.-Zugang liegt::
1 mg Adrenalin i.v.
(1 mg + 9 ml NaCl)
Alle 3-5 Min.

ROSC

Sofortige Behandlung

- cABCDE-Schema anwenden
- Monitoring vervollständigen
- Pulsoxy, Kapno und RR
- Ziel SpO2:94-98%
- Normokapnie: 35-45 mmHg
- 12-Kanal-EKG
- PCI bei kardialer Ursache
- Vermeiden von Fieber
- Ziel T: 32-36°C

Indikation für den CorpulsCPR®:

- Hochwertige Thoraxkompressionen sind durch das Personal nicht durchführbar
- Prolongierte CPR, z.B. bei Hypothermie oder nach Lyse
- Transport unter CPR

Während CPR

- Durchgehend CPR sicherstellen: Frequenz, Tiefe, Entlastung
- Maßnahmen planen vor CPR-Unterbrechung
- 100% Sauerstoff
- Atemwegsmanagement: MB -> LM -> ETI
- Kapnographie obligat
- Herzdruckmassage ohne Unterbrechung, wenn Atemweg gesichert und keine Leckage
- Gefäßzugang: intravenös, ggf. intraossär
- Reversible Ursachen behandeln

Reversible Ursachen

4 Hs

- › HypOXie
- › HypoVOLämie
- › Hypo-/HyperKALlämie/metabolisch
- › HypoTHERMie

HITS

- › HERZbeutelamponade
- › INTOXikation
- › THROMBose (AMI, LAE)
- › SPANNungspneumothorax

Leit-Symptome

- Bellender Husten
- Heiserkeit
- Inspiratorischer Stridor
- Typisch nächtliches Erwachen

Basismaßnahmen

- Eltern beruhigen
- Inhalation kühler, feuchter Luft
- So wenig Manipulationen wie möglich

A

Prednison:

Keine Gewichtsadaptierung notwendig!

Adrenalin:

Unverdünnt vernebeln!

Nachforderung Notarzt:

Eigenes Ermessen

WICHTIG!

Impfstatus anfragen:

Bei HIB-Impfung (Haemophilus influenzae Typ B) ist eine Epiglottitis unwahrscheinlich

Epiglottitis

Leit-Symptome

- Hohes Fieber
- Kloßige Sprache
- Speichelfluss
- Schluckbeschwerden

Basismaßnahmen

- So wenig Manipulationen wie möglich, höchstens SpO2-Messung
- Oberkörperhochlage

Impfstatus anfragen:

Bei HIB-Impfung (Haemophilus influenzae Typ B) ist eine Epiglottitis unwahrscheinlich

Adrenalin:

Unverdünnt vernebeln!

Vorgehen nach cABCDE

Notarzt alarmieren

WICHTIG!

4 mg Adrenalin inhalativ
(4 ml Adrenalin)

Symptomatik
fortbestehend?

ja

nein

Zügiger Transport und
weitere Versorgung
nach Zustand des
Patienten

SK1-Anmeldung
und Transport
in Kinderklinik

A

Dyspnoezeichen beim Kind

A

- Nasenflügeln
- Inspiratorische Einziehungen
- Tachypnoe
- Husten
- Heiserkeit
- Stridor
- Giemen

Atemwegsmanagement

Bewusstlose Person

Notarzt alarmieren

ja

Suffiziente Atmung?

nein

Mund-Rachen-Inspektion

Atemwege freimachen:

- Esmarch-Handgriff
- Guedel / Wendl
- Fremdkörperentfernung
- Absaugung

ja

Suffiziente Atmung?

nein

Beutel-Masken-Beatmung mit O2-Reservoir

Beatmung optimieren

- Maskengröße ändern
- Doppelter C-Griff
- Daumenballen-Methode

ja

Beatmung möglich?

nein

ja

Beatmung möglich?

nein

Larynxmaske

Ggf. Larynxmaske

Beatmung möglich?

ja

nein

Endotracheale Intubation

Sicher ist nur die kontinuierliche Kapnographie!

ja

Beatmung möglich?

nein

Hochdosierte Sauerstoffgabe und weitere Versorgung des Patienten

Versuch Koniotomie

A

Kardiales Lungenödem

DD:

- › Aspiration
- › Pulmonaler Infekt
- › toxisches Lungenödem

Zusatzmaßnahmen

- › 12-Kanal-EKG

Basismaßnahmen

- › Herzbettlagerung

Kontraindikationen Nitrat

- › Unverträglichkeit/Allergie
- › Rechtsherzinfarkt/-belastung
- › RRsys < 120 mmHg
- › HF < 60 oder > 120/min
- › Einnahme von PDE-5-Hemmern (-afil) (z.B. Viagra®, Cialis® oder Levitra®) in den letzten 48 Stunden

Hypervolämie:

- › periphere Ödeme
- › Gewichtszunahme in der letzten Zeit

Kontraindikationen Furosemid

- › Unverträglichkeit/Allergie
- › RR sys < 120 mmHg
- › Hypovolämie, Dehydration
- › Anurie

Nachforderung Notarzt:
Eigenes Ermessen

**Akuter Asthmaanfall/
Exacerbierte COPD**

Vorgehen nach cABCDE

Kontraindikationen
Ipramol?

ja

nein

1 Fertiglösung Ipramol
via Verneblermaske
mit 8 Liter O₂/Min.

i.v.-Zugang legen

250 mg Prednisolon i.v.
(Einmalige Bolusgabe)

Besserung
nach 5 Min?
Kontraindikationen
Reproterol?

ja

nein

0,09 mg Reproterol i.v.
(Einmalige Bolusgabe)

Weitere Versorgung nach Zustand
des Patienten

Transport

Symptome

- Tachy-Dyspnoe
- Giemen
- Verlängertes Expirium
Husten evtl. Auswurf
- Einsatz der
Atemhilfsmuskulatur
- Silent-lung-Phänomen

Kontraindikationen

Ipramol

- › HF > 160/Min.
- › Tachykardie Arrhythmien
- › Akutes Koronarsyndrom

enthält

2,5 mg Salbutamol
0,5 mg Ipratropiumbromid

Bei COPD:

Ziel-SpO₂: 88 – 92%

Kontraindikationen

Reproterol

- › HF > 160/Min.
- › Tachykardie Arrhythmien
- › Akutes Koronarsyndrom

WICHTIG!

Reproterol:

Auf 10 ml NaCl langsam i.v.

Nachforderung Notarzt:

Eigenes Ermessen

Bei COPD:

NIV-Therapie erwägen

(siehe Algorithmus „NIV,“)

NIV-Therapie
bei hypoxämischer akuter respiratorischer Insuffizienz (z.B. Lungenödem)

- Voraussetzungen**
- › Unzureichende Besserung auf Maßnahmen entsprechend Algorithmus „Kardiales Lungenödem“
 - › Abwesenheit von Kontraindikationen (s.u.)

- Kontraindikationen**
- › Fehlende Spontanatmung
 - › Koma (Ausnahme: V.a. CO₂-Retention)
 - › Massive Ablehnung durch den Patienten
 - › Verlegung der Atemwege
 - › GI-Blutung, Ileus, Übelkeit/Erbrechen
 - › Verletzungen im Gesicht
 - › Asthmaanfall
 - › Hautemphysem/ V.a. Pneumothorax

- Beachte**
- › Maske zunächst manuell fixieren
 - › Bei Toleranz Gurte verwenden
 - › Auf Leckage und Verlegung der Mundöffnung achten -> Anpassung

Voraussetzungen NIV erfüllt?

ja

nein

- Vorbereitung**
- › Auswahl Maskengröße
 - › Fixierspinne positionieren
 - › Vorgehen dem Patienten erklären
 - › Vorbereitung Beatmungsgerät

- NIV
Initiale Geräteeinstellung**
- › FiO₂: 100 %
 - › PEEP: 5 mbar
 - › Ggf. ΔPsupp: 3 mbar

Keine NIV-Therapie

Besserung nach 2-3 Min.?

nein

ja

Neue Kontraindikationen?

nein

ja

Neue Kontraindikationen?

nein

ja

NIV abbrechen

- Anpassung der Geräteeinstellung**
- › PEEP in 1er-Schritten bis max. 10 mbar erhöhen
 - › Ggf. Druckunterstützung (ΔPsupp) bis 8 mbar erhöhen
 - › FiO₂ nach SpO₂ anpassen

NIV fortsetzen
Weitere Versorgung nach Zustand des Patienten

- Erfolgskriterien**
- › Abnahme von Dyspnoe, Atem- und/oder Herzfrequenz
 - › Anstieg der Sauerstoffsättigung
 - › Besserung der Atemmechanik
 - › Abnahme der Unruhe, Besserung der Vigilanz

SK1-Anmeldung und Transport

NIV-Therapie

bei hyperkapnischer akuter respiratorischer Insuffizienz (z.B. COPD)

Voraussetzungen

- › Unzureichende Besserung auf Maßnahmen entsprechend Algorithmus „Exacerbierte COPD“
- › Abwesenheit von Kontraindikationen (s.u.)

Kontraindikationen

- › Fehlende Spontanatmung
- › Koma (Ausnahme: V.a. CO₂-Retention)
- › Massive Ablehnung durch den Patienten
- › Verlegung der Atemwege
- › GI-Blutung, Ileus, Übelkeit/Erbrechen
- › Verletzungen im Gesicht
- › Asthmaanfall
- › Hautemphysem/ V.a. Pneumothorax

Beachte

- › Maske zunächst manuell fixieren
- › Bei Toleranz Gurte verwenden
- › Auf Leckage und Verlegung der Mundöffnung achten -> Anpassung

Voraussetzungen NIV erfüllt?

nein

ja

Vorbereitung

- › Auswahl Maskengröße
- › Fixierspinne positionieren
- › Vorgehen dem Patienten erklären
- › Vorbereitung Beatmungsgerät

NIV

Initiale Geräteeinstellung

- › FiO₂: 100 %
- › ΔP_{supp}: 5 mbar
- › PEEP: 5 mbar
- › insp. Trigger niedrig

Besserung nach 2-3 Min.?

ja

nein

Neue Kontraindikationen?

ja

nein

Neue Kontraindikationen?

nein

ja

NIV abbrechen

Anpassung der Geräteeinstellung

- › ΔP_{supp} in 1er-Schritten bis max. 10 mbar erhöhen
- › Ggf. PEEP bis 7 mbar erhöhen
- › FiO₂ nach SpO₂ anpassen

NIV fortsetzen

Weitere Versorgung nach Zustand des Patienten

Erfolgskriterien

- › Abnahme von Dyspnoe, Atem- und/oder Herzfrequenz
- › Anstieg der Sauerstoffsättigung
- › Besserung der Atemmechanik
- › Abnahme der Unruhe, Besserung der Vigilanz
- › SpO₂-Ziel bei COPD: 88 – 92 %

< 10 Minuten

< 50 Minuten

Akutes Coronarsyndrom

Notarzt alarmieren

Differenzialdiagnosen

- › Lungenembolie
- › Aortendissektion
- › Pneumothorax
- › Pneumonie
- › Wirbelsäulensyndrom
- › Intercostalneuralgie
- › Trauma

Zusatzmaßnahmen

- › 12-Kanal-EKG innerhalb 10 Min.

Kontraindikationen ASS

- › Unverträglichkeit/Allergie
- › Aktive Blutung

Kontraindikationen Morphin

- › Unverträglichkeit/Allergie
- › GCS < 14
- › Anzeichen Rechtsherzbelastung
- › RR sys. < 120 mmHg
- › HF < 60 oder > 120/min
- › Maximaldosis 10 mg!

Kontraindikationen Heparin

- › Unverträglichkeit oder HIT
- › aktive Blutung

Kontraindikationen Nitrat

- › Unverträglichkeit/Allergie
- › Anzeichen Rechtsherzbelastung
- › RR sys. < 120 mmHg
- › HF < 60 oder > 120/min
- › Einnahme von PDE-5-Hemmern (Wirkstoffe enden auf -afil) (z.B. Viagra®, Cialis® oder Levitra®) in den letzten 48 Stunden

› siehe „Hypertensiver Notfall“

NOMI-Risikopatienten

- › fortbestehende Beschwerden
- › EKG-Veränderungen
- › Diabetes mellitus
- › vorangegangener Coronar-Intervention

Versorgungsgebiete der Coronararterien

Versorgungsgebiete im EKG erkennen

Seitenwand

Unterwand

Unterwand

Seitenwand

Unterwand

Vorderwand

Vorderwand

Vorderwand

Vorderwand

Seitenwand

Seitenwand

RCX

RCA

RCA

RCX

RCA

RIVA

RIVA

RIVA

RIVA

RCX

RCX

Hochrisiko-EKG: OMI = Okklusiver Myokardinfarkt

STEMI

- Klinik + ST-Hebung: $\geq 1\text{mm}$ in mind. 2 zusammenhängenden Ableitungen
- V2/V3: $\geq 1,5\text{mm}$ (♀)
 $\geq 2\text{mm}$ (♂ >40 Jahre)
 $\geq 2,5\text{mm}$ (♂ <40 Jahre)
- rV3-4 / V7-9: $\geq 0,5\text{mm}$

Extremitätenableitungen

- konvexe Hebung
- aus absteigender R Zacke

Brustwandableitungen

- konvexe Hebung
- aus aufsteigender S-Zacke

Hohe T-Wellen

Breite, hohe Ts und/oder $T \geq R$: Akute Ischämie noch vor ST-Hebung. DD: Hyperkaliämie

„Semi-STEMI“

Diskrete, (noch) nicht signifikante ST-Hebungen + kontralaterale ST-Senkungen + typische Klinik
 Kurzfristige Verlaufs-EKGs (alle 10-20 Min, sofort bei neuen Symptomen). Anhaltende Klinik: Frühzeitig Coro!

Hochrisiko-EKG: OMI = Okklusiver Myokardinfarkt

„Hauptstamm-EKG“

ST-Hebung in aVR

ST-Senkungen in (6) 9 Ableitungen

DeWinter Zeichen

Hochgradiger Verdacht auf RIVA-Verschluss

DeWinter Zeichen
V1-6: prominente T-Welle +
aszendierende ST-Senkung $\geq 1\text{mm}$

Quelle: nerdfallmedizin

Hochrisiko-EKG: OMI = Okklusiver Myokardinfarkt

Wellens-Zeichen

Verdacht auf kritische RIVA-Stenose

Wellens-Zeichen

oft intermittierend (auch *nach AP*)
 Typ A: biphasisches T V2/3
 Typ B: Tief invertiertes T Vorderwand

Quelle: nerdfallmedizin

Shark-Fin Zeichen

Shark-Fin Zeichen

QRS mit ST verschmelzend bei massiver ST-Hebung. Meist mehrere zusammenhängende Ableitungen.

Häufig post/peri-Arrest!

Quelle: nerdfallmedizin

Hochrisiko-EKG: OMI = Okklusiver Myokardinfarkt

Blockbild

Linksschenkelblock

Rechtsschenkelblock

Hochrisiko-EKG: OMI = Okklusiver Myokardinfarkt

Blockbild

Jeweils bei typischer / verdächtiger Klinik für Myokardinfarkt:

- **Neuer Links- / Rechtsschenkelblock** bei bekanntem Vor-EKG oder veränderte Morphologie bei bekanntem Block
- **RSB: ST-Hebung „aus dem Block“** / sonstige Hebungen (ein „normaler“ RSB hebt nie). Neuer RSB: DD LAE!
- **LSB mit mod. Sgarbossa-Kriterien** oder Schrittmacher mit LSB-Bild:

Quelle: nerdfallmedizin

modifizierte Sgarbossa-Kriterien

1. Konkordante ST-Hebung $\geq 1\text{mm}$
2. Konkordante ST-Senkung $\geq 1\text{mm}$ (in V1-3)
3. Diskordante ST-Hebung $\geq 1\text{mm}$ (mind. 25% der S-Zacke)

Wenn mind. **ein** Kriterium erfüllt, akuter Infarkt bei entsprechender Klinik wahrscheinlich.

Hochrisiko-EKG: OMI = Okklusiver Myokardinfarkt

Rechtsherzinfarkt

- Bei Hebungen in II, III, avF
- ➔ rechtsventrikuläre Ableitungen ergänzen
- ➔ RV-Infarkt: diskrete Hebung in V1 + deutliche Hebungen in V3r – V5r

rechtsventrikulär

Quelle: nerdfallmedizin

Quelle: E. Ratzenböck et al., EKG an 60 Fällen lernen und üben, Springer-Verlag

Hochrisiko-EKG: OMI = Okklusiver Myokardinfarkt

Posteriorinfarkt

- Isolierte ST-Senkungen in V1 – V3
- ➔ posteriore Ableitungen ergänzen
- ➔ Posterior-Infarkt: Hebungen in V7 - V9

posterior

V1-3
V7-9

7 8 9

V1-3 bleiben unverändert
V4-6 werden zu V7-9:
V7 hintere Axillarlinie 5. ICR
V8 mittlere Scapula 5. ICR
V9 paravertebral 5. ICR

Quelle: nerdfallmedizin

Adrenalingabe bei Instabiler Bradykardie

1 mg + 100 ml → Adrenalin 10 µg / ml

2 – 10 µg
= 0,2 – 1 ml

Unbedingt deutlich beschriften!

Pacer-Therapie bei Instabiler Bradykardie

Pat.ID n/a 4:04 503 m

HF 78 SpO2 PP NIBD

STIM

Schrittmacher DEMAND Intensität 20 mA Frequenz 70 /min

Stimulation Intens. Modus Freq. Pause Aus

corpuls

- › Klebeelektroden anterior – posterior (rot)
- › "Pacer" im „Demand“-Modus anwählen
- › Stimulationsfrequenz: 70 / min
- › Stromstärke beginnend bei 20 mA steigern bis jedem Spike ein QRS-Komplex folgt und ein Puls tastbar ist
- › Sicherheitsmarge addieren

Hypertensiver Notfall

Symptome

- > RRsys > 180 mmHg +
- Zeichen einer Organdysfunktion:**
- > hochroter Kopf
- > Kopfschmerzen, Schwindel
- > Angina pectoris
- > Dyspnoe
- > Augenflimmern
- > Übelkeit, Erbrechen
- > nicht-traumatisches. Nasenbluten

Kontraindikationen Urapidil

- > Unverträglichkeit/Allergie
- > Schwangerschaft, Stillzeit

CAVE

Den Blutdruck nicht um mehr als 20 % des Ausgangsdrucks senken.

Nachforderung Notarzt:
Eigenes Ermessen

Anaphylaktische Reaktion

Nachforderung Notarzt:
Eigenes Ermessen

Allergenzufuhr stoppen

Vorgehen nach cABCDE

Adrenalin i.m.:
 < 6 Jahre 0,15 mg
 6-12 Jahre 0,30 mg
 > 12 Jahre 0,50 mg

Adrenalin inhalativ
5 mg pur fortlaufend

Ipramol® inhalativ
0,5 / 2,5 mg fortlaufend

Vollelektrolytlösung
Erwachsene: 1000 ml
Kinder 20 ml / kgKG

Prednisolon i.v.
 < 6 Jahre 50 mg
 6-12 Jahre 100 mg
 > 12 Jahre 250 mg
 Einmalige Bolusgabe

H1-Blocker: Clemastin i.v.
 Einmalige Bolusgabe
 1-6 Jahre 0,5 mg
 6-12 Jahre 1 mg
 > 12 Jahre 2 mg
H2-Blocker: Cimetidin 200 mg i.v.

Weitere Versorgung nach Zustand des Patienten

Transport

Stadien der Anaphylaktischen Reaktion

Stadium	0	1	2	3	4
Klinik	Lokale Hautreaktion	Ausgebreitete Hautreaktion	Kreislaufreaktion Atemwegsreaktion Gastrointestinale Reaktion	Schock massive Dyspnoe Bronchospasmus Zyanose	Atem - Kreislaufstillstand

Intramuskuläre Adrenalin Injektion

Injektion mittels
Totraumspritze

M. Quadriceps femoris

M. deltoideus

Quelle Fotos: Heinemann, N/et al.: Intramuskuläre Injektion im Rahmen der Anaphylaxie, Notfall & Rettungsmedizin, 2019. 22:342-6

Schlaganfall

BEFAST

Balance

Eyes

Face

Arms

Speech

Time

Quelle: Wakemed

Der BEFAST-Test ist dann positiv, wenn ein Kriterium positiv ist!

Bei zwei positiven Kriterien und einem Herdblick ist der Verschluss eines großen Gefäßes (LVO) wahrscheinlich, so dass hier an die Möglichkeit der Thrombektomie gedacht werden sollte.

Nach TIA:

7-Tage Schlaganfallrisiko	4,2 %
30-Tage Schlaganfallrisiko	6,3 %
90-Tage Schlaganfallrisiko	10-20 %

Leitlinien-Auszug

Nr.	Text der Empfehlung	Grad ¹	LoE ²	Lit.
A	Alle akuten Schlaganfallpatienten sollen auf einer Stroke Unit behandelt werden.	↑↑	1	[8, 10, 14]
Statement: Der Vorteil der Behandlung auf einer Stroke Unit gilt für alle Schlaganfalltypen, alle Schweregrade und unabhängig vom Alter (Konsens 100 %).				
B	Patienten mit TIA-Symptomatik innerhalb der letzten 48 Stunden sollten umgehend auf einer Stroke Unit behandelt werden.	↑	2	[17]

**Opioidintoxikation/
-überdosierung
mit Ateminsuffizienz**

Vorgehen nach cABCDE

Notarzt alarmieren

i.v.-Zugang legen

0,08 mg Naloxon i.v.

ja

Bestehende
Symptomatik nach
1 Minute?

nein

Weitere Versorgung nach
Zustand des Patienten

Transport

Symptome

- › Miosis
- › Bradypnoe, Atemdepression
- › Koma
- › Bradykardie
- › Hypotonie
- › Zyanose/Hypoxie

Basismaßnahmen

- › Stimulation
- › Atemwege freimachen
- › Sauerstoffgabe
- › Maskenbeatmung

Naloxon

1 ml (= 0,4 mg) Naloxon
+ 9 ml NaCl 0,9 %
in einer 10 ml Spritze
(1 ml = 0,04 mg Naloxon)
(2 ml = 0,08 mg Naloxon)

Bestehender generalisierter Anfall Erwachsener

Epileptischer Anfall
› oft tonisch-klonisch
› 90% sistieren nach 2 Min

Zusatzmaßnahmen
› Patient vor Sekundärverletzungen schützen!

Vorgehen nach cABCDE

i.v.-Zugang vorhanden?

nein

10 mg Midazolam i.n.

ja

5 mg Midazolam i.v.

i.v.-Zugang legen

Anfall hält > 5 Min an

nein

ja

5 mg Midazolam i.v.

Anfall hält weiter an

ja

Notarzt alarmieren

nein

Weitere Versorgung nach Zustand des Patienten

Transport

Midazolam intranasal
› MAD benutzen
› 15mg / 3ml Ampulle
› 5mg = 1ml pro Nasenloch

Bestehender generalisierter Anfall Kind

Vorgehen nach cABCDE

Notarzt alarmieren

Fieberkrampf

- › 6 Monate – 6 Jahre
- › klonische Krämpfe
- › tonische Phase fehlt oft
- › 90% sistieren nach 3 Min

Zusatzmaßnahmen

- › Patient vor Sekundärverletzungen schützen!

D

Fieberkrampf

einfacher

- Dauer $\leq$ 5 Min.
- Kurze Postiktalphase

komplizierter

- Dauer $>$ 5 Min.
- Längere Postiktalphase

Midazolam buccal
(Buccolam®)

3 - <12 Mo	2,5 mg	0,5 ml
1 - < 5 J	5 mg	1,0 ml
5 - < 10 J	7,5 mg	1,5 ml
10 - < 18 J	10 mg	2,0 ml

Farblich nach Alter gestaffelte Spritzen

Hypoglykämie

Vorgehen nach cABCDE

Schutzreflexe/
Wach?

ja

nein

i.v.-Zugang legen

8 g Glukose i.v.
(40 ml Glukose 20 %)

BZ < 80 mg/dl?

ja

nein

WICHTIG!

Kriterien zum
Verbleib vor Ort
erfüllt?

ja

nein

Transport

Symptome

- › BZ häufig < 60 mg/dl
- › Unruhe, Zittern, akute Erregung
- › Blässe, Schwitzen, kalter Schweiß
- › Somnolenz bis Bewusstlosigkeit
- › Sprachstörungen, Hemiparese
- › epileptische Anfälle

Nachforderung Notarzt:
Eigenes Ermessen

Glukose p.o.
(200 ml Apfelsaft ≈ 22 g Glukose)

BZ < 80 mg/dl?

ja

nein

Kein Transport
Versorgung vor Ort

Kriterien zum Verbleib vor Ort

- › BZ > 100 mg/dl nach 30 Min
- › GCS 15 nach 30 Min
- › Bekannter Insulinpflichtiger Diabetes
- › Feste Kohlenhydrate gegessen
- › Betreuung vor Ort gewährleistet

D

Symptome

- › Fieber
- › Gerötetes Gesicht
- › Schüttelfrost

Zusatzmaßnahmen

- › Physikalische Temperatursenkung, z.B. Wadenwickel

Kontraindikationen Paracetamol

- › Unverträglichkeit/Allergie
- › Paracetamol-Gabe in den letzten 4 Stunden
- › Paracetamol-Gabe von 60 mg / kg in den letzten 24 Stunden

Nachforderung Notarzt:
Eigenes Ermessen

**Starke Schmerzen
NRS ≥ 5
(ab 12 Jahren)**

Vorgehen nach cABCDE

i.v.-Zugang legen

Kontraindikationen Piritramid?

- Kontraindikationen Piritramid**
- › Störungen der Atemfunktion
 - › Schwere COPD
 - › Opioidabhängigkeit
 - › SpO₂ < 95 %
 - › HF < 50 oder > 130/Min.
 - › RRsys < 100 mmHg
 - › GCS < 14
 - › Kopfverletzung

nein

< 65 J.

**Piritramid
5 mg i.v.**

> 65 J.

**Piritramid
3 mg i.v.**

Ziel-NRS ≤ 4 erreicht?

nein

**Piritramid
schrittweise in
max. 5 mg
Schritten**

nein

**Piritramid
schrittweise in
max. 3 mg
Schritten**

ja

**„Call back“
nutzen**

Piritramid 1 mg / ml:
2 ml Piritramid (= 15 mg)
+ 13 ml NaCl 0,9 %
in einer 20 ml Spritze

Maximaldosis: 15 mg!

Weitere Versorgung nach
Zustand des Patienten

Transport

E

WICHTIG!

CAVE
Eine Piritramid-Gabe außerhalb des hier genannten Algorithmus bedeutet einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) und ist strafbar!

Abdominelle Schmerzen

Symptome

- › Starker (NRS ≥ 5) abdomineller Schmerz
- › Dauerschmerz bei Peritonismus
- › Wellenförmiger Schmerz bei Kolik
- › Isoliertes E-Problem

Cave:

C-Problem: V.a. akutes Aortensyndrom!

Zusatzmaßnahmen

- › 12-Kanal-EKG bei Oberbauchschmerzen

Kontraindikationen Metamizol

- › Unverträglichkeit/Allergie
- › RR sys < 120 mmHg
- › Schwangerschaft, Stillzeit

Kontraindikationen Butylscopolamin

- › Unverträglichkeit/Allergie
- › (Instabile) Tachykardie
- › Muskelschwäche (Myasthenia gravis)
- › Ileus
- › Glaukom
- › Schwangerschaft, Stillzeit
- › Max. Dosis von 40 mg erreicht

E

Butylscopolamin

1 ml (= 20 mg) Butylscopolamin + 9 ml NaCl 0,9 %

Nachforderung Notarzt:
Eigenes Ermessen

Hinweise auf Infektion

- › Husten
-> **Pneumonie**
- › Brennender Urin, Flankenklopferschmerz, Kolik
-> **Harnwegsinfekt**
- › Bauchschmerzen
-> **Akutes Abdomen**
- › Wundinfektion bei Diabetes, pAVK
-> **Weichteilinfekt**
- › Kopfschmerzen, Meningismus
-> **Meningitis**
- › Kürzliche OP
- › Infiziertes Tampon

qSOFA-Score (ab 16 Jahren)

- › AF ≥ 22/Min. 1 Punkt
- › RR ≤ 100 mmHg 1 Punkt
- › GCS < 15 1 Punkt

Weitere Hinweise

- › Temp. > 38 °C oder < 36 °C

Kontraindikationen Flüssigkeitstherapie

- › Schwere Herzinsuffizienz
- › Feuchte Rasselgeräusche
- › Terminale Niereninsuffizienz (Dialysepatient)

Kontraindikationen Paracetamol

- › Unverträglichkeit/Allergie
- › Lebererkrankung

Nachforderung Notarzt:
Eigenes Ermessen

E

Orale Intoxikation

GIZ Expertise einholen

GIZ

GiftInformationsZentrum Nord
› Giftnotruf: 0551-19240

Vorgehen nach cABCDE

Wichtig!

- › Giftasservierung
- › Stoff
- › Zeitpunkt
- › Menge

ja

Orale Giftaufnahme
> 60 Min

nein

ja

Kontraindikationen
Kohle?

nein

Kontraindikationen Kohle

- › Eingeschränkte Schutzreflexe
- › GCS < 14
- › Intox mit Laugen und Säuren
- › Intox mit Alkoholen
- › Intox mit Schwermetallen

Kohle oral

Erwachsene: 1 Flasche
Kinder < 12 J.: ½ Flasche
Kinder < 4 J.: ¼ Flasche

Kohle (Ultracarbon®)

- › 50 g
- › Wasser bis zur Markierung einfüllen, ca. 400 ml
- › gut schütteln

Weitere Versorgung nach
Zustand des Patienten

Transport

Nachforderung Notarzt:
Eigenes Ermessen

E

E

Verbrennungstiefe

Grad der Verbrennung	Betroffene Hautschichten	Klinik
1	Epidermis	Rötung, starker Schmerz, wie Sonnenbrand
2a	Oberflächige Dermis	Blasenbildung, Wundgrund rosig und rekupillarisierend, starker Schmerz, Haare fest verankert
2b	Tiefe Dermis (mit Hautanhangsgebilden)	Blasenbildung, Wundgrund blasser und nicht oder schwach rekupillarisierend, reduzierter Schmerz, Haare leicht zu entfernen
3	Komplette Dermis	Trockener, weißer, lederartig harter Wundgrund, keine Schmerzen, keine Haare mehr vorhanden
4	Unterhautfettgewebe, Muskelfaszie, Muskeln, Knochen	Verkohlung

Quelle Foto: Paulinchen e.V.

Ausmaß verbrannte Körperoberfläche (vKOF) ab II°

Quelle Foto: Berger A, Hjermer R (2003) Plastische Chirurgie. Springer, Berlin Heidelberg New York, Kap. 20, S 350, Abb. 20.3b

Unter 15%, fleckig verteilten Stellen oder bei Kindern kann die Handflächenregel verwendet werden

Quelle Foto: Leitlinie „Behandlung thermischer Verletzungen des Erwachsenen“ - S2k 2021

Indikationen für die stationäre Behandlung in Zentren für Brandverletzte

- Verbrennungen Grad 2 von 10 % und mehr Körperoberfläche
- Verbrennungen Grad 3
- Verbrennungen an Händen, Gesicht oder Genitalien
- Verbrennungen durch Elektrizität, inklusive Blitzschlag
- Verätzungen durch Chemikalien
- Inhalationstrauma, grundsätzlich bei Explosionsunfällen
- Verbrennungspatienten mit Begleiterkrankungen oder Verletzungen, die die Behandlung erschweren

Erstversorgung Neugeborenes

Notarzt alarmieren

Trocknen und Wärmen

Muskeltonus, Atmung, HF?

**Schnappatmung
keine Atmung**

Neutralposition
Öffnen der Atemwege
5 Beatmungen

**Kein Anstieg der HF
Thorax hebt sich nicht**

Lagerung optimieren
2-Hände-Esmarch
Atemwegshilfen
5 Beatmungen wiederholen

**Thorax hebt sich
HF < 60/Min**

HDM 3:1

HF < 60/Min

Adrenalin 0,3 ml 1:10.000

60s

$F_{iO_2}: 0,21$

**Akzeptable
präductale SpO_2**
(rechte Hand)
2 min: 60 %
3 min: 70 %
4 min: 80 %
5 min: 85 %
10 min: 90 %

Alle 30s HF beurteilen

Erhöhung der F_{iO_2}

E

Analgo-Sedierung

Schweres Extremitätentrauma / therm. Schaden >5% vKOF / Pacer / Tourniquet

Rescue-Dosiertabelle intranasal über MAD
Esketamin / Midazolam

Kinder	Esketamin		Midazolam	
	Dosierung	Menge bei 25mg/ml	Dosierung	Menge bei 15mg / 3ml
Kg KG	~2 mg/kg		Wenn erforderlich, dann zeitversetzt applizieren	
10 15	25 mg	1 ml	2,5 mg	0,5 ml
20 40	50 mg	2 ml

Erwachsene	Esketamin		Midazolam	
	Dosierung	Menge bei 25mg/ml	Dosierung	Menge bei 15mg / 3ml
KG	1 mg/kg		Wenn erforderlich, dann zeitversetzt applizieren	
50 100	50 mg	2 ml	5 mg	1 ml

Dosiertabelle intravenös

Midazolam / Esketamin

Körpergewicht auf die nächste Zehnerstelle auf- oder abrunden.

(z.B. 64 kg auf 60 kg bzw. 65 kg auf 70 kg)

Dosierung Esketamin i.v.		Menge Esketamin bei 5mg/ml	
	0,125mg/kg	0,25mg/kg	0,125mg/kg	0,25mg/kg
Körpergewicht	0,125mg/kg	0,25mg/kg	0,125mg/kg	0,25mg/kg
40	5 mg	10 mg	1 ml	2 ml
50	7,5 mg	12,5 mg	1,5 ml	2,5 ml
60	7,5 mg	15 mg	1,5 ml	3 ml
70	10 mg	17,5 mg	2 ml	3,5 ml
80	10 mg	20 mg	2 ml	4 ml
90	12,5 mg	22,5 mg	2,5 ml	4,5 ml
100	12,5 mg	25 mg	2,5 ml	5 ml

Esketamin
5 mg/ml

Durchführung nur durch Mitarbeitende mit entsprechender Zertifizierung

W

Acetylsalicylsäure

**Wirkstoff |
Handelsnamen**

Acetylsalicylsäure |
Aspirin®, Aspisol®

Zusammensetzung

› 1 Amp. à 500 mg/5 ml
(Trockensubstanz zur Herstellung einer Injektionslösung)

Indikation

› Akutes Koronarsyndrom

Wirkung

› Vor allem durch die irreversible COX1-Hemmung verhindert ASS die Bildung von Thromboxan-A₂, was zu einer Hemmung der Thrombozytenaggregation führt.

Dosierung

› 250 mg i.v.

Nebenwirkungen

› Gastritis
› Bronchospasmus, Asthmaanfall
› Allergische Reaktion
› Verlängerung der Blutungszeit

Kontraindikationen

› Aktive Blutungen
› Unverträglichkeit/Allergie gegen Salicylate
› Schwangerschaft im letzten Drittel
› Aortendissektion
› akuter Schlaganfall

Wechselwirkungen

› Verstärkung der Wirkung gerinnungshemmender Medikamente
› Verstärkung der Wirkung und unerwünschten Wirkungen aller nicht-steroidalen Antirheumatika (z. B. Diclofenac, Ibuprofen)
› Erhöhung des Risikos von Magen-Darm-Blutungen bei gleichzeitiger Einnahme von Glukokortikoiden

Adrenalin/Epinephrin

Wirkstoff Handelsnamen	Adrenalin Suprarenin®
Zusammensetzung	<ul style="list-style-type: none"> › 1 Amp. à 25 mg/25 ml › 1 Amp. à 1 mg/ml
Indikation	<ul style="list-style-type: none"> › Kreislaufstillstand › Bradykardie › Anaphylaxie › Krupp-Syndrom / Epiglottitis
Wirkung	<ul style="list-style-type: none"> › α-adrenerge Wirkungen bei hoher Dosis: <ul style="list-style-type: none"> › Engstellung der peripheren Gefäße (Vasokonstriktion), Blutdrucksteigerung und abschwellende Wirkung › β-adrenerge Wirkungen bei niedriger Dosis: <ul style="list-style-type: none"> › β₁-Rezeptoren: Zunahme von Herzfrequenz, Herzzeitvolumen und Herzkraft, Blutdruckanstieg › β₂-Rezeptoren: Verminderung des Tonus der Bronchialmuskulatur (Bronchodilatation)
Dosierung	<ul style="list-style-type: none"> › Reanimation: <ul style="list-style-type: none"> Erwachsene: 1 mg i.v. (verdünnt) Kinder: 0,01 mg/kgKG i.v. (verdünnt) (Verdünnung: 1 mg Adrenalin auf 10 ml NaCl 0,9%, davon 0,1 ml/kgKG i.v.) › Allergische Reaktion: <ul style="list-style-type: none"> < 6 Jahre 0,15 mg i.m. (unverdünnt) 6-12 Jahre 0,30 mg i.m. (unverdünnt) > 12 Jahre 0,50 mg i.m. (unverdünnt) › Inspiratorischer Stridor/Allergische Reaktion mit A-Problem: 5 mg / 5 ml inhalativ (unverdünnt) › Bradykardie: <ul style="list-style-type: none"> 2 – 10 µg Boli (Verdünnung: 1 mg Adrenalin auf 100 ml NaCl 0,9%, davon 2 - 10 ml i.v.)
Nebenwirkungen	<ul style="list-style-type: none"> › Tachykardie, Arrhythmie, Gefahr von Extrasystolen bis zum Kammerflimmern › Hyperglykämie › Tremor (Zittern) › Mydriasis (Pupillenerweiterung)
Kontraindikationen	› Im Notfall bei oben genannter Indikation: keine
Wechselwirkungen	› Nicht zusammen mit alkalischen Lösungen verabreichen (z.B. Natriumbikarbonat)

Amiodaron

**Wirkstoff |
Handelsnamen**

Amiodaron | Cordarex®

Zusammensetzung

› 1 Amp. à 150 mg/3 ml

Indikation

› Reanimation bei therapierefraktärem Kammerflimmern/pVT

Wirkung

› Wirkungseintritt nach 2-5 Minuten
› Amiodaron ist ein Klasse-III-Antiarrhythmikum (vorwiegender Kalium-Kanal-Blocker). Es verlängert das Aktionspotenzial und die Refraktärzeit des Myokards. Wie alle Antiarrhythmika kann Amiodaron selbst Rhythmusstörungen auslösen.

Dosierung

› Erwachsene: 300 mg i.v. als Bolus nach der 3. erfolglosen Defibrillation | Kinder: 5 mg/kgKG i.v.
› Erwachsene: 150 mg i.v. als Bolus nach der 5. erfolglosen Defibrillation | Kinder: 5 mg/kgKG i.v.

Nebenwirkungen

› Einzelfälle bei QT-Zeit-Verlängerung:
Torsade de Pointes, Kammerflimmern, Asystolie

Kontraindikationen

› Im Notfall bei oben genannter Indikation: keine

Wechselwirkungen

› Verstärkung von herzfrequenzsenkenden Medikamenten insbesondere Digitalis und Verapamil

Atropin

**Wirkstoff |
Handelsnamen**

Atropinsulfat | Atropin

Zusammensetzung

› 1 Amp. à 0,5 mg/1 ml

Indikation

› Instabile/akute bradykarde Herzrhythmusstörungen

Wirkung

- › Hemmt die Aktivität des parasympathischen Nervensystems
- › Anticholinergikum
- › Herzfrequenzsteigerung durch Hemmung des Nervus vagus
- › Verbesserung der Reizleitung von den Vorhöfen in die Kammern

Dosierung

› 0,5-1 mg i.v.

Nebenwirkungen

- › Bradykardie kann bei Unterdosierung verstärkt werden
- › Mundtrockenheit
- › Verminderte Schweißsekretion
- › Tachykardie
- › Sehstörungen
- › Bei Patienten mit Down-Syndrom ausgeprägte Tachykardien bereits bei niedrigen Dosierungen möglich

Kontraindikationen

› Im Notfall bei oben genannter Indikation: keine

Wechselwirkungen

› Nicht zusammen mit alkalischen Lösungen verabreichen (z.B. Natriumbikarbonat)

Butylscopolamin

**Wirkstoff/
Handelsnamen** Butylscopolamin |
Buscopan

Zusammensetzung › 1 Amp. à 20mg/1 ml

Indikation › Kolikartige Schmerzen durch Spasmen der glatten Muskulatur von Magen, Darm, Gallenwegen, Harnleitendem System und weiblichem Genital („Regelschmerzen“) ab 16 Jahren

Wirkung › Blockade der muskarinergen Acetylcholinrezeptoren der glatten Muskulatur der Hohlorgane (Anticholinergikum)

Dosierung › 20 mg – 40 mg i.v. (verdünnt langsam über 30 Sek.)
(Verdünnung von 1 ml Butylscopolamin (= 20 mg) mit 9 ml NaCl 0,9 %)

Nebenwirkungen › Tachykardie (Vorsicht bei kardialen Vorerkrankungen wie KHK)
› Sehstörungen
› Mundtrockenheit
› Verminderte Schweißsekretion
› Miktionsstörungen
› Allergische Reaktion
› Blutdruckabfall

Kontraindikationen › Unverträglichkeit/Allergie
› (Instabile) Tachykardie
› Muskelschwäche (Myasthenia gravis)
› Ileus
› Glaukom
› Schwangerschaft, Stillzeit

Wechselwirkungen › Verstärkung anticholinergischer Nebenwirkungen bei gleichzeitiger Einnahme von anderen anticholinergen Medikamenten (z.B. Ipratropiumbromid) sowie Verstärkung der tachykarden Wirkung von beta-Sympatomimetika (z.B. Salbutamol)
› Bei gleichzeitiger Einnahme von Dopaminantagonisten (z.B. MCP) kann es zur Abschwächung der gewünschten Wirkung im Magen-Darm-Trakt kommen

Cimetidin

**Wirkstoff |
Handelsnamen**

Cimetidin | H2Blocker-ratiopharm®

Zusammensetzung

› 1 Amp. à 200 mg/2 ml

Indikation

› Anaphylaxie

Wirkung

› Blockade des Histamin 2 Rezeptors an glatter Gefäßmuskulatur, Herz und Magen, so dass Histamin nicht mehr wirken kann.

Dosierung

› 200 mg auf 10 ml NaCl 0,9% langsam i.v.

Nebenwirkungen

› Bradykardie bei zu schneller Injektion!

Kontraindikationen

› Allergie/Unverträglichkeit gegen den Wirkstoff

Wechselwirkungen

› Wirkungsverlängerung verschiedener Medikamente wie β -Blocker, Ca-Antagonisten, Antiarrhythmika, Benzodiazepine, Antiepileptika

Clemastin

**Wirkstoff |
Handelsnamen**

Clemastinfumarat |
Tavegil®

Zusammensetzung

› 1 Amp. à 2 mg/2 ml

Indikation

› Anaphylaxie

Wirkung

- › Blockade des Histamin 1 Rezeptors an Blutgefäßen, Bronchien, Darm und ZNS, so dass Histamin nicht mehr wirken kann.
- › Blockade der muscarinergen Acetylcholin-Rezeptoren

Dosierung

- › 1 - 6 Jahre 0,5 mg
- › 6 - 12 Jahre 1,0 mg
- › > 12 Jahre 2,0 mg

Nebenwirkungen

- › Sedierung, insbesondere bei Kindern auch paradoxe Wirkung mit Erregungszuständen
- › Mundtrockenheit
- › Tachykardie
- › Kopfschmerzen
- › Schwindel
- › Hautreaktionen
- › Übelkeit und Erbrechen

Kontraindikationen

› Im Notfall bei oben genannter Indikation: keine

Wechselwirkungen

› Die Wirkung von Analgetika, Hypnotika, Narkotika, Psychopharmaka und Alkohol kann verstärkt werden

Dimenhydrinat

**Wirkstoff |
Handelsnamen**

Dimenhydrinat | Vomex A®

Zusammensetzung

› 1 Amp. à 62 mg/10 ml

Indikation

› Übelkeit/Erbrechen
› bei Kontraindikationen für Ondansetron

Wirkung

› zentral und peripher wirksames Antiemetikum
› Blockade der Histamin-1-Rezeptoren und der muskarinergen Acetylcholinrezeptoren an der Area postrema

Dosierung

› 62 mg langsam i.v.

Nebenwirkungen

› Sedierung
› Mundtrockenheit
› Tachykardie
› Sehstörungen
› Schwindel
› Senkung der Krampfschwelle

Kontraindikationen

› Allergie / Unverträglichkeit
› Vigilanzminderung
› Glaukom
› Asthmaanfall
› Epilepsie
› Gabe mit anderen sedierenden Medikamenten

Wechselwirkungen

› Der sedierende Effekt verstärkt sich in Kombination mit Antihistaminika, Opioiden, Sedativa und Alkohol.

Esketamin

**Wirkstoff |
Handelsnamen**

Esketamin (S-Ketamin) |
Ketanest®S

Zusammensetzung

- › 1 Amp. à 50 mg/2 ml
- › 1 Amp. à 100 mg/20 ml

Indikation

- › Starke Schmerzen ab NRS 5 bei:
Schwerem Extremitätentrauma
Thermischem Schaden > 5% vKOF
Pacer
Tourniquet

Wirkung

- › NMDA-Rezeptor-Antagonist
- › Abkopplung der Großhirnrinde im Thalamus
- › Führt zu einer dissoziativen Anästhesie mit Hypnose und Analgesie unter Erhalt der Spontanatmung, der Schutzreflexe und des Muskeltonus
- › Zentral anticholinergereffekt im limbischen System mit hypnotischer und halluzinogener Wirkung
- › Zentral sympathomimetische Wirkung führt zur Steigerung des Sympathikus mit kreislaufstabilisierendem und bronchodilatatorischem Effekt
- › Wirkdauer 20 Minuten

Dosierung

- › **0,125 – 0,25 mg/kg i.v.**, Repetition von 0,125 mg/kg möglich
- › Für intravenöse Applikation: 5mg/ml Ampulle nutzen!
- › Rescue-Analgesie über den MAD:
- › 10 – 15 kg: **25 mg i.n.**
- › Ab 20 kg: **50 mg i.n.**
- › Für intranasale Applikation: 25mg/ml Ampulle nutzen!

Nebenwirkungen

- › Übelkeit/Erbrechen
- › Atemdepression
- › Alpträume
- › Hypersalivation
- › RR- und HF-Anstieg

Kontraindikationen

- › Unverträglichkeit/Allergie
- › ACS
- › RR > 180/100 mmHg
- › Hirndruck ohne Beatmung
- › Präeklampsie / Eklampsie.
- › Schwangerschaft / Stillzeit
- › Symptomatische Hyperthyreose
- › (Aortenstenose)

CAVE!

- › Verstärkung anderer zentral dämpfender Medikamente
- › Übergang zur Narkose

Furosemid

**Wirkstoff |
Handelsnamen**

Furosemid |
Furorese®, Lasix®

Zusammensetzung

› 1 Amp. à 40 mg/4 ml

Indikation

› Kardiales Lungenödem mit Hypervolämie

Wirkung

- › Wirkungseintritt nach 2-15 Minuten
- › Starkes, schnell und kurz wirksames Schleifendiuretikum
- › Reversible Hemmung des Na⁺-/K⁺-/2Cl⁻-Co-Transporters in der Henleschen-Schleife, dadurch wird mehr Natrium und damit mehr Wasser, also mehr Urin ausgeschieden.
- › Stimulierung des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems
- › Vorlastsenkung
- › Vasodilatation

Dosierung

› 40 mg i.v.

Nebenwirkungen

- › Hypotonie
- › Hypokaliämie
- › Kopfschmerzen, Schwindel
- › Durst

Kontraindikationen

- › Hypovolämie, Dehydration
- › RR sys < 120 mmHg
- › Hypokaliämie/-natriämie
- › Unverträglichkeit/Allergie gegen Furosemid
- › Anurie
- › Terminale Niereninsuffizienz/Dialysepflicht

Wechselwirkungen

- › Verstärkung des Kaliumverlustes bei gleichzeitiger Einnahme von Glukokortikoiden oder Laxantien
- › Toxizitätsverstärkung von Digitalispräparaten (Cave: HRST)
- › Wirkungsverstärkung von Antihypertensiva
- › Wirkungsabschwächung von Antidiabetika und Vasopressoren

Glukose 20 %

**Wirkstoff |
Handelsnamen**

Glukosemonohydrat | Glukose

Zusammensetzung

› 1 Amp. à 2 g Glukose/10 ml

Indikation

› Hypoglykämie
› im Rahmen des Schlaganfalls
bereits ab einem BZ < 80 mg/dl

Wirkung

› Wirkungseintritt nach 2-5 Minuten
› Erhöhung der Blutzuckerkonzentration
› Verbesserung der Zellfunktion

Dosierung

› 8 g Glukose i.v. (initial)
› Repetitionsgaben nach Blutzucker und Wirkung

› Bei erhaltenen Schutzreflexen: 200 ml Apfelsaft oder
40 ml Glukose 20 % (= 8 g) p.o.
› Repetitionsgaben nach Blutzucker und Wirkung

Nebenwirkungen

› Stark ausgeprägte Venenreizung
› Nekrosen bei paravenöser Applikation
› Bei bestimmungsgemäßer Anwendung sind keine weiteren
Nebenwirkungen zu erwarten

Kontraindikationen

› Hyperglykämie
› Unsicherer venöser Zugang

Wechselwirkungen

› Keine bekannt

Glyceroltrinitrat

**Wirkstoff |
Handelsnamen**

Glyceroltrinitrat | Nitrolingual®, Corangin®

Zusammensetzung

› 1 Hub à 0,4 mg Glyceroltrinitrat

Indikation

› NOMI
› Kardiales Lungenödem

Wirkung

› Wirkungseintritt nach 1-2 Minuten
› Glyceroltrinitrat ist ein Vasodilatator und wird im Körper schnell abgebaut. Dabei entsteht Stickstoffmonoxid, ein körpereigener Botenstoff, der die Koronararterien erweitert und die Durchblutung des Herzens verbessert.
› Zusätzliche Vasodilatation großer venöser Blutgefäße, wodurch das Blut langsamer und in geringerer Menge zum Herzen zurückfließt (Vorlastsenkung) und das Herz entlastet.

Dosierung

› NOMI 1 - 2 Hübe s.l.
› Kardiales Lungenödem 2 Hübe s.l.

Nebenwirkungen

› Kopfschmerzen
› Schwindelgefühl
› Störung der Blutdruckregulation, Reflextachykardie
› Hautrötung mit Hitzegefühl (Flush)

Kontraindikationen

› RRsys < 120 mmHg
› HF < 60 oder > 120/min
› Kardiogener Schock
› Anzeichen einer Rechtsherzbelastung
› Einnahme von PDE-5-Hemmern (Wirkstoffe enden auf -afil) (z.B. Viagra®, Cialis®, Levitra®) zur Behandlung von Sexualitätsstörungen oder einer pulmonalen arteriellen Hypertonie in den letzten 48 Stunden
› Unverträglichkeit/Allergie gegen Nitrate

Wechselwirkungen

› Bei gleichzeitiger Einnahme von PDE-5-Hemmern, anderen blutdrucksenkenden Medikamenten und/oder Diuretika kann es zu einer erheblichen Verstärkung des blutdrucksenkenden Effektes kommen

Heparin

**Wirkstoff |
Handelsnamen**

Heparin-Natrium |
Heparin®

Zusammensetzung

› 1 Amp. à 5000 IE
/ 0,2 ml

Indikation

› OMI

Wirkung

› Verstärkung des körpereigenen Antithrombin, welches die Wirksamkeit von Thrombin hemmt. Durch die Hemmung von Thrombin wird der Aufbau eines Fibrinnetzes verhindert.

Dosierung

› 5000 IE i.v. (Applikation mittels Tottraumspritze)

Nebenwirkungen

› Allergische Reaktion
› Ausbildung einer HIT (Heparin induzierte Thrombozytopenie)
› Verlängerung der Blutungszeit

Kontraindikationen

› Aktive Blutungen
› HIT (Heparin induzierte Thrombozytopenie)
› Unverträglichkeit/Allergie gegen den Wirkstoff
› akutes Aortensyndrom
› akuter Schlaganfall

Wechselwirkungen

› Verstärkung der Wirkung gerinnungshemmender Medikamente

Ipramol

Wirkstoff | Handelsnamen

Ipratropiumbromid und Salbutamol | Ipramol®

Zusammensetzung

› 1 Amp. à 0,5 mg Ipratropiumbromid und
2,5 mg Salbutamol / 2,5 ml Fertiginhalat

Indikation

› Atemnot bei COPD, Asthma oder einer Bronchospastik
im Rahmen der Anaphylaxie

Wirkung

› Wirkungseintritt nach 1-3 Minuten
› Anticholinergikum, welches eine Bronchokonstriktion verhindert
in Kombination mit einem β 2-Sympathomimetikum, welches zu
einer Bronchodilatation führt.
› Überwiegend lokale Wirkung
› Nur geringe systemische unerwünschte Wirkungen, wie z.B.
die Herzfrequenzsteigerung über β 1-Rezeptoren

Dosierung

› 1 Fertiginhalat inhalativ
› Fortlaufende Vernebelung bei fortbestehenden Beschwerden

Nebenwirkungen

› Kopfschmerzen
› Irritationen im Rachenbereich, Husten
› Mundtrockenheit
› Gastrointestinale Beschwerden
› Schwindelgefühl
› Glaukomanfall
› Blasenentleerungsstörungen
› Tremor, Unruhe
› Herzklopfen (Palpitationen)
› Tachykardie, Arrhythmien
› Auslösung von Angina-Pectoris-Anfällen
› Hypokaliämie, Hypoglykämie

Kontraindikationen

› HF > 160/Min.
› Tachykardie Arrhythmien
› Akutes Koronarsyndrom
› Hypertonie, ausgeprägte KHK
› BZ-Entgleisung
› Schilddrüsenüberfunktion
› Schwangerschaft, Stillzeit (strenge Indikationsstellung)

Wechselwirkungen

› Die Wirkung von Ipratropiumbromid kann von β -Sympathomimetika und Xanthinderivaten wie Theophyllin verstärkt werden
› Aufhebung/Abschwächung der Wirkung bei gleichzeitiger Einnahme von Beta-Blockern möglich

Kohle

**Wirkstoff |
Handelsnamen**

Medizinische Kohle |
Ultracarbon®

Zusammensetzung

- › 1 Flasche à 50g medizinischer Kohlenstoff
- › Muss mit Leitungswasser aufgelöst werden

Indikation

- › Intoxikationen oral aufgenommener Stoffe
< 1 Stunde

Wirkung

- › Bindet die im Magen befindlichen
Stoffe und verhindert deren
Aufnahme ins Blut

Dosierung

- › Erwachsene: 1 Flasche
- › Kinder < 12 J.: ½ Flasche
- › Kinder < 4 J.: ¼ Flasche

Nebenwirkungen

- › Schwarzfärbung der Mundhöhle
- › Obstipation

Kontraindikationen

- › Intoxikation mit Säuren, Laugen, Schwermetallen
- › Alkoholintoxikation
- › Bewusstseinsstörungen
- › Eingeschränkte Schutzreflexe
- › Ileus

Wechselwirkungen

- › keine bekannt

Metamizol

**Wirkstoff |
Handelsnamen**

Metamizol-Natrium |
Novaminsulfon®,
Novalgin®

Zusammensetzung

› 1 Amp. à 1 mg/2 ml

Indikation

› Abdominelle Schmerzen

Wirkung

- › Durch Hemmung der Cyclooxygenase (COX-2) wird die Prostaglandinsynthese gehemmt
- › analgetischer Effekt (schmerzhemmend)
- › antipyretischer Effekt (fiebersenkend)
- › spasmolytischer Effekt (krampflösend)

Dosierung

› 1 g in 100 ml NaCl 0,9% als Kurzinfusion über 5 Minuten

Nebenwirkungen

- › Hypotonie
- › Anaphylaktische Reaktionen
- › bei Langzeitanwendung selten: Agranulozytose

Kontraindikationen

- › Unverträglichkeit/Allergie gegen Metamizol
- › Schwangerschaft, Stillzeit
- › Einnahme von Methotrexat (MTX)
- › Blutbildende Erkrankungen
- › RR sys < 120 mmHg

Wechselwirkungen

› Verstärkt die Blutdrucksenkende Wirkung anderer Medikamente

Midazolam

**Wirkstoff |
Handelsnamen**

Midazolam |
BUCCOLAM®

Zusammensetzung

- › 1 Spritze (gelb) à 2,5 mg/0,5 ml
- › 1 Spritze (blau) à 5,0 mg/1,0 ml
- › 1 Spritze (violett) à 7,5 mg/1,5 ml
- › 1 Spritze (orange) à 10,0 mg/2,0 ml

Indikation

- › Bestehender generalisierter Anfall ab dem 3. Lebensmonat

Wirkung

- › Wirkungseintritt nach ca. 3-5 Minuten
- › GABA-A-Rezeptor Agonist
- › Wirkt dosisabhängig sedierend, angstlösend, antikonvulsiv und muskelentspannend

Dosierung

- › Von 3 Monaten bis unter 1 Jahr 2,5 mg (gelbe Spritze)
- › Von 1 Jahr bis unter 5 Jahren 5,0 mg (blaue Spritze)
- › Von 5 Jahren bis unter 10 Jahren 7,5 mg (violette Spritze)
- › Ab 10 Jahren 10,0 mg (orangene Spritze)
- › Buccale Applikation in die Wangentasche

Nebenwirkungen

- › Ateminsuffizienz
- › Atemwegsverlegung
- › Paradoxe Reaktionen
- › Retrograde Amnesie

Kontraindikationen

- › Bei entsprechender Indikation im Notfall keine
- › Unverträglichkeit/Allergie gegen Midazolam

Wechselwirkungen

- › In Kombination mit Alkohol, Psychopharmaka, Opioiden und Antikonvulsiva Verstärkung der Atemdepression und Sedierung
- › Wirkungsverstärkung von Muskelrelaxantien und Analgetika

CAVE!

Bei Säuglingen, insbesondere im Alter von 3 bis 6 Monaten, ist mit einem erhöhten Risiko einer Atemdepression zu rechnen. Diese kann auch verzögert auftreten!

Midazolam

**Wirkstoff |
Handelsnamen**

Midazolam | Dormicum®

Zusammensetzung

- › 1 Amp. à 5 mg/5 ml
- › 1 Amp. à 15 mg/3 ml

Indikation

- › Bestehender generalisierter Anfall Erwachsener
- › Sedierung in Kombination mit Esketamin

Wirkung

- › GABA-A-Rezeptor Agonist
- › Wirkt dosisabhängig sedierend, angstlösend, antikonvulsiv und muskelrelaxierend

Dosierung

- › Generalisierter Anfall ohne liegenden Zugang: 10 mg i.n. über den MAD
- › Generalisierter Anfall mit liegendem Zugang: 5 mg i.v.
- › Repetitivgabe bei persistierendem Anfall: 5 mg i.v.
- › Sedierung vor Esketamingabe: 1 - 2 mg i.v.

Nebenwirkungen

- › Ateminsuffizienz
- › Atemwegsverlegung
- › Paradoxe Reaktionen
- › Retrograde Amnesie

Kontraindikationen

- › Unverträglichkeit/Allergie gegen Midazolam
- › Gilt nur im Rahmen der Sedierung mit Esketamin:
Nerven- und/oder Muskelerkrankungen, die zu Muskelschwäche führen (z.B. Myasthenia gravis)
Bewusstseinsstörungen

Wechselwirkungen

- › In Kombination mit Alkohol, Psychopharmaka, Opioiden und Antikonvulsiva Verstärkung der Atemdepression und Sedierung
- › Wirkungsverstärkung von Muskelrelaxantien und Analgetika

Morphin

**Wirkstoff |
Handelsnamen**

Morphinsulfat | MSI®

Zusammensetzung

› 1 Amp. à 10 mg/1 ml

Indikation

› Schmerzen im Rahmen eines
Akuten Coronarsyndroms

Wirkung

› Opiatrezeptor-Agonist (BTM)
› Wirkungseintritt nach 1-5 Minuten
› Wirkmaximum nach 10-15 Minuten
› Wirkdauer 3-5 Stunden
› Wirkpotenz: 1

Dosierung

› 2-3 mg Schritte i.v. nach Wirkung
(Verdünnung von 1 ml Morphin (=10 mg) mit 9 ml NaCl 0,9 %
= 1 mg/ml)
› Maximaldosis 10 mg

Nebenwirkungen

› Übelkeit/Erbrechen
› Schwindel
› Miosis
› Hypotonie (Histaminfreisetzung)
› Bradykardie
› Atemdepression

Kontraindikationen

› Unverträglichkeit/Allergie
› GCS < 14
› Anzeichen einer Rechtsherzbelastung
› RR sys. < 120 mmHg
› HF < 60 oder > 120/min
› Maximaldosis 10 mg!

Wechselwirkungen

› Verstärkung anderer zentral dämpfender Medikamente

Naloxon

**Wirkstoff |
Handelsnamen**

Naloxon | Narcanti®

Zusammensetzung

› 1 Amp. à 0,4 mg/1 ml

Indikation

› Opioidintoxikation/-überdosierung mit Ateminsuffizienz

Wirkung

› Naloxon verdrängt das Opioid von den Opioidrezeptoren (kompetitiver Antagonismus). Hierdurch können die Intoxikationssymptome dosisabhängig abgemildert werden. Die Wirkdauer beträgt 30 bis 60 Minuten und ist damit kürzer als die Wirkung der meisten Opiode. Vor allem durch die Blockade des μ -Rezeptors wird die Atemdepression aufgehoben.

Dosierung

› 0,08 mg Schritte i.v. 1 ml (= 0,4 mg) Naloxon
 + 9 ml NaCl 0,9 %
 in einer 10 ml Spritze
 (1 ml = 0,04 mg Naloxon)
 (2 ml = 0,08 mg Naloxon)

Nebenwirkungen

› Akutes Entzugssyndrom bei chronischem Opioid-Missbrauch
 › Allergische Reaktionen

Kontraindikationen

› Unverträglichkeit/Allergie gegen Naloxon

Wechselwirkungen

› Keine bekannt

Merke!

› Eine titrierte Gabe hat den Vorteil, dass die Ateminsuffizienz aufgehoben wird, gleichzeitig aber keine schweren Entzugssymptome oder Schmerzen entstehen.

Ondansetron

**Wirkstoff |
Handelsnamen**

Ondansetron | Zofran®

Zusammensetzung

› 1 Amp. à 4 mg/2 ml

Indikation

› Übelkeit/Erbrechen

Wirkung

› Blockiert Serotoninrezeptoren im Brechzentrum (Area postrema)
› Selektiver 5-HT₃-Rezeptorantagonist

Dosierung

› 4 mg langsam i.v.

Nebenwirkungen

› Verlängerung der QT-Zeit
› Kopfschmerzen

Kontraindikationen

› Allergie gegen 5-HT₃-Antagonisten (Kreuzallergie zu Granisetron ist beschrieben)
› Schwangerschaft (nicht im ersten Trimenon)
› Long-QT-Syndrom

Wechselwirkungen

› QT-Zeit-verlängernde Wirkung durch Kombination mit anderen QT-Zeit-verlängernden Medikamenten

Paracetamol

**Wirkstoff |
Handelsnamen**

Paracetamol |
ben-u-ron®
Perfalgan®

Zusammensetzung

- › 1 Zäpfchen à 125 mg
- › 1 Zäpfchen à 250 mg
- › 1 Kurzinfusion à 1000 mg

Indikation

- › Fieberkrampf (T > 38,5° C)
- › Schlaganfall (T > 37,5° C)
- › Sepsis (T > 38,5° C)

Wirkung

- › Analgetische und antipyretische Eigenschaften
- › Antipyretische Wirkung (fiebersenkend), hemmt den Effekt endogener Pyrogene auf das Temperaturregulationszentrum im Hypothalamus
- › Wirkungsmechanismus ist nicht eindeutig geklärt

Dosierung

- › Bis 1 Jahr 125 mg
- › Ab 1 Jahr 250 mg
- › Ab 6 Jahren 500 mg
- › Erwachsene 1000mg

- › Tageshöstdosen:
 - 7 - 8 kgKG max. 375 mg/Tag
 - 9 - 12 kgKG max. 500 mg/Tag
 - 13 - 16 kgKG max. 750 mg/Tag
 - 17 - 25 kgKG max. 1000 mg/Tag

Nebenwirkungen

- › Sehr selten: Überempfindlichkeitsreaktionen
- › Bei Überdosierungen: Leberversagen

Kontraindikationen

- › Unverträglichkeit/Allergie gegen Paracetamol
- › Lebererkrankungen

Wechselwirkungen

- › Leberschäden bei gleichzeitiger Einnahme von Antiepileptika möglich

Piritramid

**Wirkstoff |
Handelsnamen**

Piritramid | Dipidorol®

Zusammensetzung

› 1 Amp. à 15 mg/2 ml

Indikation

› Starke Schmerzen ab NRS 5
, (bei Patienten ab 12 Jahren)

Wirkung

› Opiatrezeptor-Agonist (BTM)
› Wirkungseintritt nach 1-5 Minuten
› Wirkmaximum nach 10-15 Minuten
› Wirkdauer 4-5 Stunden
› Wirkpotenz: ~ 0,7

Dosierung

› < 65 Jahre: max.5 mg-Schritte i.v.
› > 65 Jahre: max.3 mg-Schritte i.v.
(Verdünnung von 2 ml Piritramid (=15 mg) mit 13 ml NaCl 0,9 %
= 1 mg/ml)
› Maximaldosis: 15 mg

Nebenwirkungen

› Übelkeit/Erbrechen
› Schwindel
› Miosis
› Hypotonie
› Sedierung
› Bradykardie
› Verminderte Atemfrequenz

Kontraindikationen

› Unverträglichkeit/Allergie
› Störungen der Atemfunktion, schwere COPD
› Opioidabhängigkeit
› SpO₂ < 95 %
› HF < 50 oder > 130/Min.
› RRsys < 100 mmHg
› GCS < 14
› Maximaldosis von 15 mg erreicht
› Kopfverletzung

Wechselwirkungen

› Verstärkung anderer zentral dämpfender Medikamente

Prednisolon

Wirkstoff | Handelsnamen

Prednisolon | Prednisolot®,
Solu-Decortin®

Zusammensetzung

- › 1 Amp. à 250 mg/5 ml
(Trockensubstanz zur Herstellung einer Injektionslösung)

Indikation

- › Asthma bronchiale/COPD
- › Anaphylaxie

Wirkung

- › Wirkungseintritt nach 20-30 Minuten
- › Hemmung entzündlicher Prozesse
- › Zellmembranstabilisierung mit Verminderung von Ödemen
- › Sensibilisierung von Adrenozeptoren und Verbesserung der Katecholaminwirkung

Dosierung

- › Asthma bronchiale/COPD: 250 mg i.v.
- › Allergische Reaktion:

< 6 Jahre	50 mg i.v.
6 - 12 Jahre	100 mg i.v.
> 12 Jahre	250 mg i.v.

Nebenwirkungen

- › Überempfindlichkeitsreaktion
- › Weitere Nebenwirkungen sind bei der Akuttherapie nicht zu erwarten

Kontraindikationen

- › Unverträglichkeit/Allergie gegen Prednisolon
- › Ansonsten keine für die kurzfristige Anwendung

Wechselwirkungen

- › Wirkung von Antidiabetika wird vermindert

Prednison

Wirkstoff | Handelsnamen Prednison | Infectocortikrupp®
Rectodelt®

Zusammensetzung › 1 Zäpfchen
à 100 mg Prednisolonacetat

Indikation › Krupp-Syndrom

Wirkung

- › Wirkungseintritt nach 20-30 Minuten
- › Hemmung entzündlicher Prozesse
- › Zellmembranstabilisierung mit Verminderung von Ödemen
- › Sensibilisierung von Adrenozeptoren und Verbesserung der Katecholaminwirkung

Dosierung

- › Kinder: 100 mg Prednisolon supp. (altersunabhängig)
- › Eine Tagesgesamtdosis von 200 mg sollte nicht überschritten werden.

Nebenwirkungen

- › Überempfindlichkeitsreaktion
- › Weitere Nebenwirkungen sind bei der Akuttherapie nicht zu erwarten

Kontraindikationen

- › Unverträglichkeit/Allergie gegen Prednisolon
- › Ansonsten keine für die kurzfristige Anwendung

Wechselwirkungen › Wirkung von Antidiabetika wird vermindert

Reproterol

**Wirkstoff |
Handelsnamen**

Reproterol | Bronchospasmin®

Zusammensetzung

› 1 Amp. à 0,09 mg/ml

Indikation

› Akute obstruktive Atemwegserkrankungen
› Asthma bronchiale, COPD

Wirkung

› Reproterol gehört zur Gruppe der selektiven, intravenösen β_2 -Sympathomimetika, d.h. es stimuliert überwiegend an β_2 -Rezeptoren aber auch gering an β_1 -Rezeptoren.

› β_2 -Rezeptor-vermittelte Wirkung (erwünscht):
› Erschlaffung der glatten Muskulatur in Bronchien (Bronchodilatation)

› β_1 -Rezeptor-vermittelte Wirkung (gering, unerwünscht):
› Kardiale Stimulation (u.a. Steigerung der Herzfrequenz)

Dosierung

› 0,09 mg auf 10 ml mit NaCl 0,9% verdünnen und langsam i.v.

Nebenwirkungen

› Tremor, Unruhe, Zittern
› Herzklopfen (Palpitationen)
› Tachykardien
› Auslösung von Angina-Pectoris-Anfällen
› Hypokaliämie, Hypoglykämie
› Tokolyse

Kontraindikationen

› HF > 160/Min
› Tachykarde Arrhythmien
› Akutes Coronarsyndrom
› schwere Schilddrüsenüberfunktion
› Geburtsbeginn
› Schwangerschaft, Stillzeit (strenge Indikationsstellung)

Wechselwirkungen

› Aufhebung/Abschwächung der Wirkung bei gleichzeitiger Einnahme von Beta-Blockern möglich
› Wirkungsverstärkung bei gleichzeitiger Gabe von anderen Sympathomimetika oder Xanthinderivaten wie z.B. Theophyllin

Tranexamsäure

**Wirkstoff |
Handelsnamen**

Tranexamsäure | Cyclocapron®

Zusammensetzung

› 1 Amp. à 500mg / 5ml

Indikation

› Nicht kontrollierbare,
kritische Blutung

Wirkung

› Antifibrinolytikum
› Blockiert die Umwandlung von Plasminogen zu Plasmin
und verhindert so die Auflösung des Fibrinnetzes

Dosierung

› 1 g in 100ml NaCl 0,9% als Kurzinfusion über 5 Minuten

Nebenwirkungen

› keine relevanten Nebenwirkungen bekannt

Kontraindikationen

› bei entsprechender Indikation im Notfall keine

Wechselwirkungen

› keine relevanten bekannt

Urapidil

**Wirkstoff |
Handelsnamen**

Urapidil | Ebrantil®

Zusammensetzung

› 1 Amp. à 25 mg/5 ml

Indikation

› Hypertensiver Notfall

Wirkung

- › Peripher wirkender α_1 -Antagonist
- › Weitstellung der Gefäße
- › Zentrale Sympathikushemmung
- › Keine relevante ReflEXTACHYKARDIE

Dosierung

› in 5 mg Schritten i.v. titriert bis maximal 25 mg
oder RR um 20% des Ausgangswertes gesenkt

Nebenwirkungen

- › Hypotonie mit entsprechender Symptomatik wie Schwindel, Übelkeit
- › Selten: Allergische Reaktionen

Kontraindikationen

- › Schwangerschaft, Stillzeit
- › Unverträglichkeit/Allergie gegen Urapidil

Wechselwirkungen

- › Wirkungsverstärkung in Kombination mit Alkohol
- › Wirkungsverstärkung bei gleichzeitiger Gabe anderer blutdrucksenkender Medikamente

Vorbereitung Perfusor

Medikament	Ampulle	Zubereitung	Konzentration
Propofol 1%	200 mg / 20 ml	50 ml pur aufziehen	10 mg / ml
Propofol 2%	1000 mg / 50 ml	Stechampulle pur aufziehen	20 mg / ml
Noradrenalin*	10 mg / 10 ml	5 ml Noradrenalin + 45 ml NaCl0,9%	0,1 mg / ml
DOBUTamin	250 mg / 50 ml	Stechampulle pur aufziehen	5mg / ml
Adrenalin*	25 mg / 25 ml	3 ml Adrenalin + 47 ml NaCl0,9%	60 µg / ml

* ja nach Zustand des Patienten und Wunsch des Arztes, andere Ansatzkonzentration möglich -> Absprache NA

Dosierung	Indikation
4 - 10 mg / kg / h	Narkoseaufrechterhaltung
4 - 10 mg / kg / h	Narkoseaufrechterhaltung
< 5 ml / h (niedrig)	Hypotonie / Schock
> 5 ml / h (mittel)	
> 10 ml / h (hoch)	
2,5 µg / kg / min (niedrig)	kardiogener Schock
5,0 µg / kg / min (mittel)	
10 µg / kg / min (hoch)	
1 - 10 µg / min	kardiogener Schock
© Dr. Rickes 09-2021	

Vorbereitung Narkosemedikamente

Präoxygenierung		
Analgesie	Sufentanil 5 µg/ml	1 Ampulle pur 10ml
	esKETamin 5 mg/ml	1 Ampulle pur 20 ml
Hypnose	Midazolam 1 mg/ml	15mg / 3 ml + NaCl (12ml) aufgezogen: 15ml
	Propofol 1% 10 mg/ml	1 Ampulle pur 20 ml
	Thiopental 25 mg/ml	+ AQUA (20ml) aufziehen: 20 ml
Relaxierung	ROCuronium 10 mg/ml	2 Ampullen pur 10 ml
	Suxamethonium 20 mg/ml	1 Ampulle pur 5 ml

Zusammenarbeit mit der Leitstelle

Nachfragen zu Alarmstichworten

Nachfragen zu Alarmstichworten sollten in den allermeisten Fällen auf ein Minimum reduziert werden, um Funkverkehr und Ressourcen nicht unnötig zu belasten.

Nachforderung Notarzt

Wird an der Einsatzstelle ein Notarzt (NEF / RTH) benötigt, wird dieser immer mit einem Einsatzstichwort oder dem Grund der Nachforderung angefordert. Dies verhindert ein Nachfragen des Notarztes nach dem Grund der Nachforderung. Hierfür muss der PRIO-Sprechwunsch „0“ genutzt werden.

Abbestellen eines NEF

Ein auf der Anfahrt befindliches NEF wird grundsätzlich nur über die Leitstelle unter Nutzung der „Sprechwunsch“-Taste „5“ abbestellt.

5

Ansprechen Leitstelle

Die Leitstelle wird grundsätzlich über die „Sprechwunsch“-Taste „5“ kontaktiert. In einer zeitkritischen Situation (NA, FW, POL) oder für Rückmeldungen bei unklaren Lagen muss hierfür der PRIO-Sprechwunsch „0“ genutzt werden.

Leitstelle

Zusammenarbeit mit der Leitstelle

1

Status 1

Der Status 1 „Einsatzbereit ab Funk“ wird grundsätzlich sofort gedrückt, wenn das Rettungsmittel wieder einsatzbereit ist, gleich welchen Standort es hat.

2. Rettungsmittel zur Reanimation

Im Falle einer Reanimation wird – falls verfügbar – ein zweites Rettungsmittel zur Einsatzstelle alarmiert, um das Team vor Ort zu unterstützen.

Probleme / Störungen / Komplikationen

Der Leitstellen-Schichtführer steht bei Fragen als Ansprechpartner (24/7) zur Sofortabstimmung für die Rettungsdienste zur Verfügung und ist unter der folgenden Nummer zu erreichen: 04462-20435580

„Call back“

Die Nutzung des „Call back“-Systems erfolgt grundsätzlich über die Leitstelle. Diese stellt die telefonische Verbindung zwischen Notarzt und RTW her. Diese Vorgehensweise sichert die Dokumentation des stattgehabten Gespräches und wird als zusätzlicher Einsatz angelegt.

Eigene Notizen

A large rectangular area filled with a fine grid of small squares, intended for taking handwritten notes. The grid covers most of the page below the header and title.

Eigene Notizen

A large rectangular area filled with a fine grid of small squares, intended for taking handwritten notes. The grid covers most of the page below the header and title.

Eigene Notizen

Eigene Notizen

RETTUNGSDIENST WITTMUND gGmbH

Landkreis Wittmund
Am Markt 9
26409 Wittmund